

ความหลากหลายของค้างคาว

โครงการ อพ. สธ. ผืนป่าตะวันตก

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริ
โดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จพ.)

ธงชัย งามประเสริฐวงศ์





คำนิยม

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสาน
พระราชปณิธานต่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรของประเทศภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) ที่ทรงมีพระราชดำริให้มีการศึกษาสำรวจตั้งแต่“ยอดเขาถึงใต้ทะเล”เพื่ออนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรไทย ภูมิปัญญาไทย ให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับสนองพระราชดำริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) โดยคณะปฏิบัติการ
อพ.สธ. จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.) ได้ร่วมทำการศึกษาศาสตร์วิทยาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ต่างๆของโครงการฯ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ ได้แก่ พื้นที่สร้าง
ป่าตามแนวพระราชดำริป่าพันธุกรรมพืช อำเภอบ้านลาด จังหวัดนครราชสีมา มาจนถึงปัจจุบัน
ได้แก่ หมู่เกาะแสมสารและเกาะช้างเคียง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และเกาะต่างๆในความ
รับผิดชอบของกองทัพเรือ ในทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน พื้นที่เขาวังเขมรและแปลง ๙๐๕
อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ปลูกพันธุกรรมพืชการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ได้จัดทำ โครงการฝึกอบรมค่ายความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเยาวชน เพื่อให้เยาวชนเข้าใจในเรื่องราวของความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน

ในการนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดทำหนังสือคู่มือความหลากหลายของสิ่งมี
ชีวิตชนิดต่างๆ และการจำแนกทางอนุกรมวิธานของลักษณะประจำชนิด รวมทั้งจัดทำหนังสือ
คู่มือ ในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เยาวชนใช้ประกอบในการศึกษา
และกระตุ้นให้เยาวชนเล็งเห็นถึงความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์มากมาย เป็นการ
สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาชีววิทยาและก้าวต่อไปเป็นนักวิจัยที่ดีในอนาคตอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรของประเทศต่อไป

พรชัย จุฑามาศ

รองผู้อำนวยการ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



สารบัญ

คำนิยม	3
สารบัญ	5
บทนำ	7
ชนิดของค้างคาวในประเทศไทย	11
ค้างคาวในพื้นที่โครงการ อพ.สธ.ผืนป่าตะวันตก	22
ค้างคาวขอบหูขาวกลาง	26
ค้างคาวคุณกิตติ	28
ค้างคาวมงกุฎมุกยาวเล็ก	30
ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก	32
ค้างคาวมงกุฎปลอมใหญ่	33
ค้างคาวมงกุฎมลายู	34
ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นเล็ก	36
ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้นเล็ก	38
ค้างคาวยอดกล้วยปีกใส	40
ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวยาว	42
ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวสั้น	44
ค้างคาวไฟหัวแบนเล็ก	46
ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก	48
ค้างคาวปีกถุงเคราดำ	50
ค้างคาวสามศร	52
ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์	53
ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสีจาง	54
ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กหูใหญ่	56
ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ	58
บรรณานุกรม	60
ภาคผนวก	61
กิตติกรรมประกาศ	



ความหลากหลายของค้างคาว ในพื้นที่โครงการ อพ. สธ. ผืนป่าตะวันตก

ธงชัย งามประเสริฐวงศ์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทนำ

ค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเพียงกลุ่มเดียวที่มีปีกและสามารถบินได้ เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของ “นกมีหู หนูมีปีก” เนื่องจากมีลักษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายหนู แต่มีปีกและสามารถบินได้เหมือนนก โดยปีกของค้างคาวจะมีลักษณะเป็นแผ่นหนังเชื่อมระหว่างกระดูกแขน กระดูกขา และกระดูกนิ้วขึ้นต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นพังผืด ในทางอนุกรมวิธานค้างคาวถูกจัดอยู่ในอันดับ (order) Chiroptera (มาจากรากศัพท์ภาษากรีก มีความหมายว่า มือที่เป็นปีก) แบ่งออกเป็น 18 วงศ์ (family) 203 สกุล (genus) ซึ่งรวมแล้วมีมากกว่า 1,200 ชนิดทั่วโลก จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สูงเป็นอันดับสองรองจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มฟันแทะ (อันดับ Rodentia)



ลักษณะของปีกค้างคาวที่มีแผ่นหนังเชื่อมกระดูกแขน กระดูกขา และกระดูกนิ้วเข้าด้วยกัน

ประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อของเขตทางชีวภูมิศาสตร์หลายเขต มีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศหลายแบบ มีลักษณะของดินอาศัยที่หลากหลาย ส่งผลให้ประเทศไทยมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูง ซึ่งในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในประเทศไทย ค้างคาวมีจำนวนชนิดพันธุ์มากที่สุด ค้างคาวในประเทศไทยมีความหลากหลายมาก ในจำนวนนี้มีทั้งค้างคาวคุณกิตติ ซึ่งเป็นค้างคาวที่มีขนาดเล็กที่สุด มีน้ำหนักตัวเพียง 2-3 กรัม และค้างคาวแม่ไก่ปาฝน ซึ่งเป็นค้างคาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีน้ำหนักตัวกว่า 1 กิโลกรัม และเมื่อปีกกางออกเต็มทีอาจกว้างถึง 1.5 เมตร

เราสามารถพบค้างคาวได้ในทุกภาคของประเทศไทย บางชนิดอาศัยอยู่ในถ้ำ หรือตามซอกหิน บางชนิดเกาะตามต้นไม้ในที่โล่งแจ้ง บางชนิดอาศัยในต้นไม้หรือโพรงไม้ บางครั้งเราอาจพบค้างคาวเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมด้วยก็ได้ โดยทั่วไปค้างคาวจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม บางชนิดอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กจำนวนไม่ถึงสิบตัว บางชนิดอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่จำนวนหลายพันหลายหมื่นตัว ในถ้ำขนาดใหญ่บางแห่งเราจะพบค้างคาวปากย่นจำนวนหลายล้านตัวอาศัยอยู่ร่วมกัน

ค้างคาวเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืน อาหารของค้างคาวได้แก่ผลไม้ น้ำหวาน เกสรดอกไม้ แมลง และสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามชนิดของค้างคาว ค้างคาวขนาดเล็กในประเทศไทยส่วนใหญ่กินแมลงเป็นอาหาร ส่วนค้างคาวแม่ไก่ซึ่งมีขนาดใหญ่จะกินผลไม้เป็นอาหาร พื้นที่หากินของค้างคาวก็จะแตกต่างกันไปในค้างคาวแต่ละชนิด ทั้งในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตรกรรม แหล่งน้ำ และในเขตชุมชน



ค้างคาวปีกถุงอาศัยอยู่รวมกันภายในถ้ำ



ค้างคาวแม่ไก่เกาะรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนต้นไม้



ค้างคาวมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศทั้งในด้านการผสมเกสรดอกไม้ การแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์พืช และการควบคุมแมลงศัตรูธรรมชาติ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อมนุษย์ทั้งในด้านเกษตรกรรมและสาธารณสุข อีกทั้งมูลค้างคาวกินแมลงชนิดต่างๆ ยังเป็นปุ๋ยธรรมชาติชั้นดีที่มีไนโตรเจนสูง

ค้างคาวมีอายุยืนมากอย่างน่าประหลาดใจเมื่อเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน อายุขัยของค้างคาวโดยเฉลี่ยประมาณ 10-25 ปี และจากการศึกษาอย่างต่อเนื่องพบว่าค้างคาวบางตัวมีอายุมากกว่า 30 ปี อย่างไรก็ตาม ค้างคาวหลายชนิดในประเทศไทยอยู่ในสถานภาพที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อันเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การล่า การตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นการทำลายแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของค้างคาว การรบกวนแหล่งอาศัยโดยเฉพาะในถ้ำที่มีค้างคาวอาศัยอยู่ และการใช้ยาฆ่าแมลงในพื้นที่หากินของค้างคาว เป็นต้น

ชนิดของค้างคาวในประเทศไทย

จากการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน มีการค้นพบค้างคาวชนิดใหม่ (new species) หลายชนิด และมีการรายงานการพบค้างคาวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย (new record) เพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนชนิดพันธุ์ของค้างคาวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2520 B. Lekagul และ J.A. McNeely พบค้างคาวในประเทศไทยจำนวน 92 ชนิด ในปี พ.ศ. 2535 G.B. Corbet และ J.E. Hill ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมในเขตอินโดมาลายัน และพบว่ามียะลาในประเทศไทยจำนวน 108 ชนิด ในปี พ.ศ. 2547 กัลยาณี บุญเกิด และไสว วังหงษา ได้รวบรวมรายชื่อค้างคาวที่พบในประเทศไทยรวม 120 ชนิด ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 S. Bumrungsri และคณะ ได้ทำการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวในประเทศไทย พบว่ามีค้างคาวจำนวนทั้งสิ้น 119 ชนิดที่สามารถยืนยันว่าพบในประเทศไทยและมีเอกสารสนับสนุนที่ตรวจสอบได้ ในปี พ.ศ. 2551 C.M. Francis ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพบว่ามียะลาในประเทศไทยจำนวน 120 ชนิด ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 พิพัฒน์ สร้อยสุข รายงานว่าในประเทศไทยพบค้างคาวจำนวนอย่างน้อย 138 ชนิด จาก 11 วงศ์ 45 สกุล (ตารางที่ 1)

จากการประเมินสถานภาพของค้างคาวชนิดต่างๆ ในเชิงการอนุรักษ์โดย International Union for Conservation of Nature (IUCN) พบว่า ในประเทศไทยมีค้างคาวจำนวน 1 ชนิด คือ ค้างคาวหน้ายักษ์จมูกปม ถูกจัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ (endangered) และค้างคาวจำนวน 8 ชนิด ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง ค้างคาวคุณกิตติ ค้างคาวไธ่แห่งเล็ก ค้างคาวหน้ายักษ์ริดสีด้า ค้างคาวลูกหนูมลายู ค้างคาวพื้นหน้าซ้อนปลอม ค้างคาวจมูกหลอดสีทองแดง และค้างคาวปากย่นฮาลา-บาลา นอกจากนี้ค้างคาวในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก) ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ตารางที่ 1 ค้างคาวที่พบในประเทศไทย (ดัดแปลงจาก พัทธน์ สร้อยสุข, 2554)

ชื่อไทย (ชื่อสามัญ)	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานภาพ*
Suborder MEGACHIROPTERA		
วงศ์ค้างคาวกินผลไม้ (Family PTEROPODIDAE)		
ค้างคาวแคระปามาเลย์ (Pygmy Fruit Bat, Grey Fruit Bat)	<i>Aethalops alecto</i>	LC
ค้างคาวปีกจุด (Spotted-winged Fruit Bat)	<i>Balionycteris maculata</i>	LC
ค้างคาวหัวดำ (Black-capped Fruit Bat)	<i>Chironax melanocephalus</i>	LC
ค้างคาวขอบหูขาวเล็กป่า (Forest Short-nosed Fruit Bat)	<i>Cynopterus</i> cf. <i>brachyotis</i> 'Forest'	LC
ค้างคาวขอบหูขาวเล็กซุนดา (Sunda Short-nosed Fruit Bat)	<i>Cynopterus</i> cf. <i>brachyotis</i> 'Sunda'	LC
ค้างคาวขอบหูขาวใหญ่ (Horsfield's Fruit Bat)	<i>Cynopterus horsfieldii</i>	LC
ค้างคาวขอบหูขาวกลาง (Greater Short-nosed Fruit Bat)	<i>Cynopterus sphinx</i>	LC
ค้างคาวด้ายค (Dyak Fruit Bat)	<i>Dyacopterus spadiceus</i>	NT
ค้างคาวเล็บกุด (Lesser Dawn Bat, Cave Nectar Bat)	<i>Eonycteris spelaea</i>	LC
ค้างคาวหน้ายาวเล็ก (Dagger-toothed Long-nosed Fruit Bat, Lesser Long-nosed Fruit Bat)	<i>Macroglossus minimus</i>	LC
ค้างคาวหน้ายาวใหญ่ (Greater Long-nosed Fruit Bat)	<i>Macroglossus sobrinus</i>	LC
ค้างคาวขอบหูดำไต้ (Temminck's Tailless Fruit Bat)	<i>Megaerops ecaudatus</i>	LC

ค้างคาวขอบหูดำเหนือ (Ratanaworabhan's Fruit Bat)	<i>Megaerops niphanae</i>	LC
ค้างคาวพินหน้าคู่สีเขม่า (Lucas's Short-nosed Fruit Bat, Dusky Fruit Bat)	<i>Penthetor lucasii</i>	NE
ค้างคาวแม่ไก่เกาะ (Island Flying Fox, Vari- able Flying Fox)	<i>Pteropus hypomelanus</i>	LC
ค้างคาวแม่ไก่นครสวรรค์ (Andersen's Flying Fox)	<i>Pteropus intermedius</i>	DD
ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง (Lyle's Flying Fox)	<i>Pteropus lylei</i>	VU
ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน (Large Fling Fox)	<i>Pteropus vampyrus</i>	NT
ค้างคาวบัวพันกลม (Geoffroy's Rousette)	<i>Rousettus amplexicaudatus</i>	LC
ค้างคาวบัวพันรี (Leschenault's Rousette)	<i>Rousettus leschenaultii</i>	LC
ค้างคาวดอย (Blanford's Fruit Bat, Hill Fruit Bat)	<i>Sphaerias blanfordi</i>	LC
Suborder MICROCHIROPTERA		
วงศ์ค้างคาวคุณกิตติ (Family CRASEONYCTERIDAE)		
ค้างคาวคุณกิตติ (Kitti's Hog-nosed Bat, Bumblebee Bat)	<i>Craseonycteris thonglongyai</i>	VU
วงศ์ค้างคาวหางโผล่ (Family EMBALLONURIDAE)		
ค้างคาวหางโผล่ (Lesser Sheath-tailed Bat)	<i>Emballonura monticola</i>	LC
ค้างคาวปีกถุงปลอม (Naked-rumped Pouched Bat)	<i>Saccolaimus saccolaimus</i>	LC
ค้างคาวปีกถุงต่อมค้าง (Long-winged Tomb Bat)	<i>Taphozous longimanus</i>	LC
ค้างคาวปีกถุงเคราดำ (Black-bearded Tomb Bat)	<i>Taphozous melanopogon</i>	LC

ค้างคาวปีกถุงใหญ่ (Theobald's Tomb Bat)	<i>Taphozous theobaldi</i>	LC
วงศ์ค้างคาวหน้ายักษ์ (Family HIPPOSIDERIDAE)		
ค้างคาวสามศร (Stoliczka's Asian Trident Bat)	<i>Aselliscus stoliczkanus</i>	LC
ค้างคาวไ้แหงใหญ่ (East Asian Tailless Leaf-nosed Bat)	<i>Coelops frithii</i>	LC
ค้างคาวไ้แหงเล็ก (Malayan Tailless Leaf-nosed Bat)	<i>Coelops robinsoni</i>	VU
ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ (Great Leaf-nosed Bat)	<i>Hipposideros armiger</i>	LC
ค้างคาวหน้ายักษ์สองสีเล็ก (Lesser Bicolored Leaf-nosed Bat)	<i>Hipposideros atrox</i>	NE
ค้างคาวหน้ายักษ์สองสี (Greater Bicolored Leaf-nosed Bat)	<i>Hipposideros bicolor</i>	LC
ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสีจาง (Ashy Leaf-nosed Bat)	<i>Hipposideros cineraceus</i>	LC
ค้างคาวหน้ายักษ์หมอนโค้ง (Diadem Leaf-nosed Bat)	<i>Hipposideros diadema</i>	LC
ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กหุมน (Bornean Leaf-nosed Bat)	<i>Hipposideros doriae</i>	NT
ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสาละบา (Dyak Leaf-nosed Bat)	<i>Hipposideros dyacorum</i>	LC
ค้างคาวหน้ายักษ์สองหีบ (Cantor's Leaf-nosed Bat)	<i>Hipposideros galeritus</i>	LC
ค้างคาวหน้ายักษ์สามหีบใหญ่ (Grand Leaf-nosed Bat)	<i>Hipposideros grandis</i>	DD

ค้างคาวหน้ายักษ์จมูกปม (Thailand Leaf-nosed Bat)	<i>Hipposideros halophyllus</i>	EN
ค้างคาวหน้ายักษ์สามหีบ (Intermediate Leaf-nosed Bat)	<i>Hipposideros larvatus</i>	LC
ค้างคาวหน้ายักษ์หมอนบุญส่ง (Large Asian Leaf-nosed Bat, Boonsong's Roundleaf Bat)	<i>Hipposideros lekaguli</i>	NT
ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า (Shield-faced Leaf-nosed Bat)	<i>Hipposideros lylei</i>	LC
ค้างคาวหน้ายักษ์กุ่มภกรรณ (Pendlebury's Leaf-nosed Bat)	<i>Hipposideros pendleburyi</i>	NE
ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กหูใหญ่ (Pomona Leaf-nosed Bat, Large-eared Roundleaf Bat)	<i>Hipposideros pomona</i>	LC
ค้างคาวหน้ายักษ์ริดลีย์ (Ridley's Leaf-nosed Bat)	<i>Hipposideros ridleyi</i>	VU
วงศ์ค้างคาวแวมไพร์แปลง (Family MEGADERMATIDAE)		
ค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ่ (Greater False Vampire Bat)	<i>Megaderma lyra</i>	LC
ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก (Lesser False Vampire Bat)	<i>Megaderma spasma</i>	LC
วงศ์ค้างคาวปีกพับ (Family MINIOPTERIDAE)		
ค้างคาวปีกพับใหญ่ (Eastern Bent-winged Bat)	<i>Miniopterus fuliginosus</i>	LC
ค้างคาวปีกพับดำใหญ่ (Western Bent-winged Bat)	<i>Miniopterus magnater</i>	LC
ค้างคาวปีกพับกลาง (Intermediate Bent-winged Bat)	<i>Miniopterus medius</i>	LC

ค้างคาวปีกพับเล็ก (Small Bent-winged Bat)	<i>Miniopterus pusillus</i>	LC
วงศ์ค้างคาวปากย่น (Family MOLOSSIDAE)		
ค้างคาวปากย่นฮาลา-บาลา (Johore Wrinkle-lipped Bat)	<i>Chaerephon johorensis</i>	VU
ค้างคาวปากย่น (Asian Wrinkle-lipped Bat)	<i>Chaerephon plicatus</i>	LC
ค้างคาวขนช้าง (Greater Naked Bat)	<i>Cheiromeles torquatus</i>	LC
ค้างคาวปากย่นมลายู (Malayan Free-tailed Bat)	<i>Mops mops</i>	NT
ค้างคาวปากย่นหูหลวง (La Touche's Free-tailed Bat)	<i>Tadarida latouchei</i>	DD
วงศ์ค้างคาวหน้าร่อง (Family NYCTERIDAE)		
ค้างคาวหน้าร่อง (Malayan Slit-faced Bat)	<i>Nycteris tragata</i>	NT
วงศ์ค้างคาวมงกุฏ (Family RHINOLOPHIDAE)		
ค้างคาวมงกุฏยอดสั้นใหญ่ (Accuminate Horseshoe Bat)	<i>Rhinolophus acuminatus</i>	LC
ค้างคาวมงกุฏเทาแดง (Intermediate Horseshoe Bat)	<i>Rhinolophus affinis</i>	LC
ค้างคาวมงกุฏสามใบพัดเตาดำ (Bedomme's Horseshoe Bat)	<i>Rhinolophus aff. beddomei</i>	NE
ค้างคาวมงกุฏปลอมเล็ก (Croslet Horseshoe Bat)	<i>Rhinolophus coelophyllus</i>	LC
ค้างคาวมงกุฏจุกแหลม (Blyth's Horseshoe Bat)	<i>Rhinolophus lepidus</i>	LC
ค้างคาวมงกุฏใหญ่ (Woolly Horseshoe Bat, Great Woolly Horseshoe Bat)	<i>Rhinolophus luctus</i>	LC

ค้างคาวมงกุฏหูโตเล็ก (Big-eared Horseshoe Bat)	<i>Rhinolophus macrotis</i>	LC
ค้างคาวมงกุฏมลายู (Malayan Horseshoe Bat)	<i>Rhinolophus malayanus</i>	LC
ค้างคาวมงกุฏหูโตมาร์แชล (Marshall's Horseshoe Bat)	<i>Rhinolophus marshalli</i>	LC
ค้างคาวมงกุฏเลี่ยนมลายูหางสั้นเล็ก (Indochinese Lesser Brown Horseshoe Bat)	<i>Rhinolophus microglobosus</i>	NE
ค้างคาวมงกุฏหูโตใหญ่ (Bourret's Horseshoe Bat)	<i>Rhinolophus paradoxolophus</i>	LC
ค้างคาวมงกุฏจุกยาวเล็ก (Pearson's Horseshoe Bat)	<i>Rhinolophus pearsonii</i>	LC
ค้างคาวมงกุฏเล็ก (Least Horseshoe Bat)	<i>Rhinolophus pusillus</i>	LC
ค้างคาวมงกุฏเลี่ยนมลายูเล็ก (Peninsular Horseshoe Bat)	<i>Rhinolophus robinsoni</i>	NT
ค้างคาวมงกุฏปลอมใหญ่ (Shamel's Horseshoe Bat)	<i>Rhinolophus shameli</i>	LC
ค้างคาวมงกุฏหูโตสยาม (Siamese Horseshoe Bat)	<i>Rhinolophus siamensis</i>	LC
ค้างคาวมงกุฏเลี่ยนมลายูหางสั้น (Lesser Brown Horseshoe Bat)	<i>Rhinolophus stheno</i>	LC
ค้างคาวมงกุฏจุกยาวสยาม (Thai Horseshoe Bat)	<i>Rhinolophus thailandensis</i>	NE
ค้างคาวมงกุฏยอดสั้นเล็ก (Thomas's Horseshoe Bat)	<i>Rhinolophus thomasi</i>	LC
ค้างคาวมงกุฏสามใบพัด (Trefoil Horseshoe Bat)	<i>Rhinolophus trifolius</i>	LC

ค้างคาวมงกุฎมุกยาวใหญ่ (Dobson's Horseshoe Bat)	<i>Rhinolophus yunanensis</i>	LC
วงศ์ค้างคาวหางหนู (Family RHINOPOMATIDAE)		
ค้างคาวหางหนู (Greater Mouse-tailed Bat)	<i>Rhinopoma microphyllum</i>	LC
วงศ์ค้างคาวลูกหนู (Family VESPERTILIONIDAE)		
ค้างคาวลูกหนูสร้อยคอเหลือง (Collared Sprite)	<i>Arielulus aureocollaris</i>	LC
ค้างคาวลูกหนูดำเหลือบ (Bronze Sprite, Black Gilded Pipistrelle)	<i>Arielulus circumdatus</i>	LC
ค้างคาวลูกหนูมลายู (Social Sprite)	<i>Arielulus societatis</i>	VU
ค้างคาวท้องน้ำตาลสุราษฎร์ (Surat Serotine)	<i>Eptesicus dimissus</i>	DD
ค้างคาวท้องน้ำตาลหูหนา (Thick-eared Bat)	<i>Eptesicus pachyotis</i>	LC
ค้างคาวท้องน้ำตาลใหญ่ (Common Serotine, Eurasian Serotine)	<i>Eptesicus serotinus</i>	LC
ค้างคาวตีนปุม (Disk-footed Bat)	<i>Eudiscopus denticulus</i>	DD
ค้างคาวมือปุมใหญ่ (Indochinese Thick-thumbed Bat)	<i>Glischropus bucephalus</i>	NE
ค้างคาวมือปุม (Common Thick-thumbed Bat)	<i>Glischropus tylopus</i>	LC
ค้างคาวปีกขนใต้ (Lesser Hairy-winged Bat)	<i>Harpiocephalus harpia</i>	LC
ค้างคาวพื้นหน้าข้อเล็ก (Blanford's Bat)	<i>Hesperoptenus blanfordi</i>	LC
ค้างคาวพื้นหน้าข้อใหญ่ (Tickell's Bat)	<i>Hesperoptenus tickelli</i>	LC
ค้างคาวพื้นหน้าข้อปลอม (Large False Serotine)	<i>Hesperoptenus tomesi</i>	VU
ค้างคาวลูกหนูกรมหน้าบนเล็ก (Cadorna's Pipistrelle)	<i>Hypsugo cadornae</i>	LC
ค้างคาวลูกหนูถ้ำ (Chinese Pipistrelle)	<i>Hypsugo pulveratus</i>	LC

ค้างคาวอี้อาอีโ (Great Evening Bat)	<i>Ia io</i>	LC
ค้างคาวยอดดกกล้วยหัวแบน (Flat-headed Woolly Bat)	<i>Kerivoula depressa</i>	NE
ค้างคาวยอดดกกล้วยปีกใส (Hardwicke's Woolly Bat)	<i>Kerivoula hardwickii</i>	LC
ค้างคาวยอดดกกล้วยกะฉิ่น (Kachin Woolly bat)	<i>Kerivoula kachinensis</i>	LC
ค้างคาวยอดดกกล้วยเล็ก (Least Woolly Bat)	<i>Kerivoula minuta</i>	NT
ค้างคาวยอดดกกล้วยปีกปุม (Papillose Woolly Bat)	<i>Kerivoula papillosa</i>	LC
ค้างคาวยอดดกกล้วยปีกบาง (Clear-winged Woolly Bat)	<i>Kerivoula pellucida</i>	NT
ค้างคาวยอดดกกล้วยผีเสื้อ (Painted Woolly Bat)	<i>Kerivoula picta</i>	LC
ค้างคาวยอดดกกล้วยไททาเนีย (Titania Wooly Bat)	<i>Kerivoula titania</i>	LC
ค้างคาวยอดดกกล้วยปา (Whitehead's Woolly Bat)	<i>Kerivoula whiteheadi</i>	LC
ค้างคาวจมูกหลอดสีทองแดง (Bronze Tube-nosed Bat)	<i>Murina aenea</i>	VU
ค้างคาวจมูกหลอดเล็ก (Little Tube-nosed Bat)	<i>Murina aurata</i>	LC
ค้างคาวจมูกหลอดสีเทา (Ashy Gray Tube-nosed Bat)	<i>Murina cineracea</i>	NE
ค้างคาวจมูกหลอดหูสั้น (Round-eared Tube-nosed Bat)	<i>Murina cyclotis</i>	LC
ค้างคาวจมูกหลอดหูยาว (Hutton's Tube-nosed Bat)	<i>Murina huttoni</i>	LC
ค้างคาวจมูกหลอดมลายู (Peninsular Tube-nosed Bat)	<i>Murina peninsularis</i>	NE

ค้างคาวจมูกหลอดสีน้ำตาล (Brown Tube-nosed Bat)	<i>Murina suilla</i>	LC
ค้างคาวจมูกหลอดเล็กท้องขาว (Walston's Tube-nosed Bat)	<i>Murina walstoni</i>	NE
ค้างคาวหูหน้อยอย่างขาว (Szechwan Myotis)	<i>Myotis altarium</i>	LC
ค้างคาวหูหน้อยหน้าขน (Hairy-faced Myotis)	<i>Myotis annectans</i>	LC
ค้างคาวหูหน้อยดำเหลือบ (Peters's Myotis)	<i>Myotis ater</i>	LC
ค้างคาวหูหน้อยยักษ์ (Chinese Myotis, Large Myotis)	<i>Myotis chinensis</i>	LC
ค้างคาวหูหน้อยตีนโตใหญ่ (Lesser Large-footed Myotis)	<i>Myotis hasseltii</i>	LC
ค้างคาวหูหน้อยเฮิร์แมน (Herman's Myotis)	<i>Myotis hermani</i>	DD
ค้างคาวหูหน้อยตีนโตเล็ก (Horsfield's Myotis)	<i>Myotis horsfieldii</i>	LC
ค้างคาวหูหน้อยพม่า (Burmese Whiskered Myotis)	<i>Myotis montivagus</i>	LC
ค้างคาวหูหน้อยตีนเล็กเขี้ยวยาว (Nepalese Whiskered Myotis)	<i>Myotis muricola</i>	LC
ค้างคาวหูหน้อยตีนเล็กป่าไต้หวัน (Ridley's Myotis)	<i>Myotis ridleyi</i>	NT
ค้างคาวหูหน้อยมือตื้นปุม (Thick-thumbed Myotis)	<i>Myotis rosseti</i>	LC
ค้างคาวหูหน้อยตีนเล็กเขี้ยวสั้น (Himalayan Whiskered Myotis)	<i>Myotis siligorensis</i>	LC
ค้างคาวลูกหนูปีกสั้น (Rohu's Bat)	<i>Philetor brachypterus</i>	LC
ค้างคาวฟันร่องเล็ก (Groove-toothed Trumpet-eared Bat)	<i>Phoniscus atrox</i>	NT
ค้างคาวฟันร่องใหญ่ (Peters's Trumpet-eared Bat)	<i>Phoniscus jagorii</i>	LC

ค้างคาวลูกหนูอินเดีย (Indian Pipistrelle)	<i>Pipistrellus coromandra</i>	LC
ค้างคาวลูกหนูบ้าน (Javan Pipistrelle)	<i>Pipistrellus javanicus</i>	LC
ค้างคาวลูกหนูอินโดจีน (Mount Popa Pipistrelle)	<i>Pipistrellus paterculus</i>	LC
ค้างคาวลูกหนูปีกแคบ (Narrow-winged Pipistrelle)	<i>Pipistrellus stenopterus</i>	LC
ค้างคาวลูกหนูจิ๋ว (Least Pipistrelle)	<i>Pipistrellus tenuis</i>	LC
ค้างคาวดอยหลังลายขาว (Harlequin Bat)	<i>Scotomanes ornatus</i>	LC
ค้างคาวเพดานใหญ่ (Greater Asiatic Yellow House Bat)	<i>Scotophilus heathii</i>	LC
ค้างคาวเพดานเล็ก (Lesser Asiatic Yellow House Bat)	<i>Scotophilus kuhlii</i>	LC
ค้างคาวไผ่หัวแบนเล็ก (Lesser Bamboo Bat)	<i>Tylonycteris pachypus</i>	LC
ค้างคาวไผ่หัวแบนใหญ่ (Greater Bamboo Bat)	<i>Tylonycteris robustula</i>	LC

*สถานภาพของชนิดพันธุ์ตาม The IUCN Red List of Threatened Species 2010

[EN = ใกล้สูญพันธุ์ (endangered), VU = มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable), NT = ใกล้ถูกคุกคาม (near threatened), LC = มีความเสี่ยงน้อยต่อการสูญพันธุ์ (least concern), DD = มีข้อมูลไม่เพียงพอ (data deficient), NE = ยังไม่ได้รับการประเมิน (not evaluated)]

ค้างคาวในพื้นที่โครงการ อพ. สธ. ผืนป่าตะวันตก

พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผืนป่าตะวันตก ในจังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย เป็นทั้งเชิงเขาและที่ราบบนเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพภูเขาเป็นเขาหินปูน มีทั้งแหล่งน้ำนิ่ง เช่น บึง บ่อน้ำ และแหล่งน้ำไหล เช่น แม่น้ำ ลำธาร จัดเป็นพื้นที่ประกอบด้วยถิ่นอาศัยที่หลากหลาย และยังคงมีป่าที่มีสภาพที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ แม้ว่าพื้นที่บางส่วนจะมีราษฎรอาศัยอยู่และเป็นพื้นที่เกษตรกรรม แต่พื้นที่แห่งนี้มีสัตว์ที่หาพบได้ยากหลายชนิดอาศัยอยู่ เช่น ค้างคาวคุณกิตติ เลียงผา และนกเงือกกรมช้าง อีกทั้งยังมีพื้นที่บางส่วนอยู่ติดกับพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ จึงจัดได้ว่าพื้นที่บริเวณนี้มีทรัพยากรสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย

จากการสำรวจที่ผ่านมา พบว่ามีค้างคาวจำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการ อพ. สธ. ผืนป่าตะวันตก โดยพบทั้งค้างคาวกินผลไม้ และค้างคาวกินแมลง ซึ่งมีจำนวนอย่างน้อย 19 ชนิด 10 สกุล 7 วงศ์ ใน 2 อันดับย่อย ได้แก่

Order CHIROPTERA Blumenbach, 1779

Suborder MEGACHIROPTERA Dobson, 1875

วงศ์ค้างคาวกินผลไม้

Family PTEROPODIDAE Grey, 1821

Genus *PTEROPUS* Brisson, 1762

1. ค้างคาวขอบหูขาวกลาง

Cynopterus sphinx (Vahl, 1797)



Suborder MICROCHIROPTERA Dobson, 1875



วงศ์ค้างคาวคุณกิตติ

Family CRASEONYCTERIDAE Hill, 1974

Genus *CRASEONYCTERIS* Hill, 1974

2. ค้างคาวคุณกิตติ

Craseonycteris thonglongyai Hill, 1974

วงศ์ค้างคาวมงกุฏ

Family RHINOLOPHIDAE Gray, 1825

Genus *RHINOLOPHUS* Lacépède, 1799



3. ค้างคาวมงกุฏจมูกยาวเล็ก *Rhinolophus pearsonii* Horsfield, 1851

4. ค้างคาวมงกุฏปลอมเล็ก *Rhinolophus coelophyllus* Peters, 1867

5. ค้างคาวมงกุฏปลอมใหญ่ *Rhinolophus shameli* Tate, 1943

6. ค้างคาวมงกุฏมลายู *Rhinolophus malayanus* Bonhote, 1903

7. ค้างคาวมงกุฏยอดสันเล็ก *Rhinolophus thomasi* K. Andersen, 1905

8. ค้างคาวมงกุฏเลียนมลายูหางสั้นเล็ก

Rhinolophus microglobosus Csorba and Jenkins, 1998

วงศ์ค้างคาวลูกหนู

Family VESPERTILIONIDAE Gray, 1821

Genus *KERIVOULA* Gray, 1842

9. ค้างคาวยอดดกกล้วยปึกใส

Kerivoula hardwickii (Horsfield, 1824)



Genus *MYOTIS* Kaup, 1829

10. ค้างคาวหนูหูตื้นเล็กเขี้ยวยาว

Myotis muricola (Gray, 1846)

11. ค้างคาวหนูหูตื้นเล็กเขี้ยวสั้น

Myotis siligorensis (Horsfield, 1855)



Genus *TYLONYCTERIS* Peters, 1872

12. ค้างคาวไฟหัวแบนเล็ก *Tylonycteris pachypus* (Temminck, 1840)



วงศ์ค้างคาวแวมไพร์แปลง

Family MEGADERMATIDAE H. Allen, 1864

Genus *MEGADERMA* E. Geoffroy, 1810

13. ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก

Megaderma spasma (Linnaeus, 1758)

วงศ์ค้างคาวหางโผล่

Family EMBALLONURIDAE Gervais, 1855

Genus *TAPHOZOUS* E. Geoffroy, 1818

14. ค้างคาวปีกถุงเคราดำ

Taphozous melanopogon Temminck, 1841



วงศ์ค้างคาวหน้ายักษ์

Family HIPPOSIDERIDAE Lydekker, 1891

Genus *ASELLISCUS* Tate, 1941

15. ค้างคาวสามศร *Aselliscus stoliczkanus* (Dobson, 1871)

Genus *HIPPOSIDEROS* Gray, 1831

16. ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์

Hipposideros armiger (Hodgson, 1835)

17. ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสีจาง

Hipposideros cineraceus Blyth, 1853

18. ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กหูใหญ่

Hipposideros pomona K. Andersen, 1918

19. ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลีบ

Hipposideros larvatus (Horsfield, 1823)



ค้างคาวขอบหูขาวกลาง

วงศ์ Pteropodidae Grey, 1821

สกุล *Pteropus* Brisson, 1762

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cynopterus sphinx* (Vahl, 1797)

ชื่อสามัญ Greater Short-nosed Fruit Bat, Greater Shortnosed Fruit Bat, Short-nosed Fruit Bat, Short-nosed Indian Fruit Bat

ชื่อไทย ค้างคาวขอบหูขาวกลาง

การแพร่กระจายในประเทศไทย ทั่วประเทศ

สถานภาพ Least concern (IUCN)



เป็นค้างคาวขนาดกลาง (น้ำหนัก 40 - 57 กรัม) กินผลไม้ชนิดต่างๆ เป็นอาหาร มักเกาะอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 3-7 ตัว บริเวณใต้ใบไม้ที่ค่อนข้างทึบ ได้ใบปาล์ม ซอกหิน ใต้หลังคา สามารถอยู่ได้ในถิ่นอาศัยหลายแบบ ทั้งในป่าปฐมภูมิ ป่าทุติยภูมิ เขตชุมชน หรือในเมือง



ค้างคาวขอบหูขาวกลาง

ค้างคาวคุณกิตติ

วงศ์ Craseonycteridae Hill, 1974

สกุล *Craseonycteris* Hill, 1974

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Craseonycteris thonglongyai* Hill, 1974

ชื่อสามัญ Bumblebee Bat, Hog-nosed Bat,
Kitti's Hog-nosed Bat

ชื่อไทย ค้างคาวคุณกิตติ

การแพร่กระจายในประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

สถานภาพ สัตว์ป่าคุ้มครอง/สัตว์เฉพาะถิ่น

Vulnerable C1 (IUCN)



เป็นค้างคาวที่มีขนาดเล็กมาก (น้ำหนัก 1.5-3.2 กรัม) เป็นสัตว์ที่พบเฉพาะถิ่น (endemic species) โดยจะพบเฉพาะในผืนป่าตะวันตกของประเทศไทย และในพื้นที่ด้านตะวันออกของสหภาพเมียนมาร์เท่านั้น

อาศัยอยู่ถ้ำหินปูนขนาดเล็กในบริเวณป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ สามารถปรับตัวให้อาศัยได้ในบริเวณที่มีการรบกวนจากการทำการเกษตรได้ดี เป็นค้างคาวที่กินแมลงในที่โล่งใกล้เรือนยอดไม้เป็นอาหาร โดยจะใช้เวลาส่วนใหญ่เกาะนอนในถ้ำ และบินออกหากินในเวลากลางคืนในช่วงเข้ามีดและช่วงเวลาพลบค่ำเป็นระยะเวลาดสั้นๆ และจะหากินไม่ไกลจากถ้ำที่อาศัย



ค้างคาวคุณกิตติ

ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวเล็ก

วงศ์ Rhinolophidae Gray, 1825

สกุล *Rhinolophus* Lacépède, 1799

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Rhinolophus pearsonii* Horsfield, 1851

ชื่อสามัญ Pearson's Horseshoe Bat

ชื่อไทย ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวเล็ก

การแพร่กระจายในประเทศไทย ทั่วประเทศ

สถานภาพ สัตว์ป่าคุ้มครอง

Least concern (IUCN)

เป็นค้างคาวขนาดเล็ก (น้ำหนัก 13.2 - 21.8 กรัม) กินแมลงเป็นอาหาร อาศัยอยู่ในถ้ำ โดยมากมักเป็นถ้ำหินปูน พบได้ทั้งในพื้นที่ป่า ที่ราบสูง ภูเขา หรือ บริเวณใกล้กับพื้นที่เกษตรกรรม



ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวเล็ก



ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก

วงศ์	Rhinolophidae Gray, 1825
สกุล	<i>Rhinolophus</i> Lacépède, 1799
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Rhinolophus coelophyllus</i> Peters, 1867
ชื่อสามัญ	Croset Horseshoe Bat
ชื่อไทย	ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก
การแพร่กระจายในประเทศไทย	เกือบทั่วประเทศ ยกเว้นภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
สถานภาพ	สัตว์ป่าคุ้มครอง Least concern (IUCN)

เป็นค้างคาวขนาดเล็ก (น้ำหนัก 6.2 - 8.6 กรัม) กินแมลงเป็นอาหาร มักอาศัยอยู่ในถ้ำหินปูน โดยจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่จำนวนหลายร้อยตัว พบได้ในพื้นที่ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น



ค้างคาวมงกุฎปลอมใหญ่

วงศ์	Rhinolophidae Gray, 1825
สกุล	<i>Rhinolophus</i> Lacépède, 1799
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Rhinolophus shameli</i> Tate, 1943
ชื่อสามัญ	Shamel's Horseshoe Bat
ชื่อไทย	ค้างคาวมงกุฎปลอมใหญ่
การแพร่กระจายในประเทศไทย	เกือบทั่วประเทศ ยกเว้นภาคใต้
สถานภาพ	สัตว์ป่าคุ้มครอง Least concern (IUCN)

เป็นค้างคาวขนาดเล็ก (น้ำหนัก 7.5 - 12.5 กรัม) กินแมลงเป็นอาหาร มักอาศัยอยู่ในถ้ำหินปูน พบได้ทั้งในพื้นที่ป่าเบญจพรรณ และป่าดงดิบ รวมถึงในพื้นที่ป่าที่ถูกรบกวนจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์



ค้างคาวมงกุฎมลายู

วงศ์	Rhinolophidae Gray, 1825
สกุล	<i>Rhinolophus</i> Lacépède, 1799
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Rhinolophus malayanus</i> Bonhote, 1903
ชื่อสามัญ	Malayan Horseshoe Bat
ชื่อไทย	ค้างคาวมงกุฎมลายู
การแพร่กระจายในประเทศไทย	ทั่วประเทศ
สถานภาพ	สัตว์ป่าคุ้มครอง Least concern (IUCN)

เป็นค้างคาวขนาดเล็ก (น้ำหนัก 4.5 - 9.7 กรัม) กินแมลงเป็นอาหาร อาศัยอยู่ตามถ้ำหินปูน บางครั้งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ สามารถพบได้ทั้งในพื้นที่ป่าปฐมภูมิ และป่าทุติยภูมิ รวมถึงในพื้นที่เกษตรกรรม และสวนยางพารา



ค้างคาวมงกุฎมลายู



ค้างคาวมงกุฎยอดสันเล็ก

วงศ์	Rhinolophidae Gray, 1825
สกุล	<i>Rhinolophus</i> Lacépède, 1799
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Rhinolophus thomasi</i> K. Andersen, 1905
ชื่อสามัญ	Thomas's Horseshoe Bat
ชื่อไทย	ค้างคาวมงกุฎยอดสันเล็ก
การแพร่กระจายในประเทศไทย	เกือบทั่วประเทศ ยกเว้นภาคใต้
สถานภาพ	สัตว์ป่าคุ้มครอง Least concern (IUCN)

เป็นค้างคาวขนาดเล็ก (น้ำหนัก 7 - 11 กรัม) กินแมลงเป็นอาหาร อาศัยอยู่ตามถ้ำหินปูน สามารถพบได้ทั้งในพื้นที่ป่าปฐมภูมิ และป่าทุติยภูมิ



ค้างคาวมงกุฎยอดสันเล็ก



ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้นเล็ก

วงศ์	Rhinolophidae Gray, 1825
สกุล	<i>Rhinolophus</i> Lacépède, 1799
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Rhinolophus microglobosus</i> Csorba and Jenkins, 1998
ชื่อสามัญ	Indochinese Lesser Brown Horseshoe Bat
ชื่อไทย	ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้นเล็ก
การแพร่กระจายในประเทศไทย	เกือบทั่วประเทศ ยกเว้นภาคใต้
สถานภาพ	สัตว์ป่าคุ้มครอง
	Least concern (IUCN)

เป็นค้างคาวขนาดเล็ก (น้ำหนัก 6.5 – 12.0 กรัม) กินแมลงเป็นอาหาร อาศัยอยู่ตามถ้ำหินปูน บางครั้งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ สามารถพบได้ทั้งในพื้นที่ป่าลุ่มต่ำจนถึงป่าดิบเขา



ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้นเล็ก



ค้างคาวยอตกกล้วยปิกไส

วงศ์ Vespertilionidae Gray, 1821

สกุล *Kerivoula* Gray, 1842

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Kerivoula hardwickii* (Horsfield, 1824)

ชื่อสามัญ Common Woolly Bat, Hardwicke's Forest Bat, Hardwicke's Woolly Bat, Hardwicke's Woolly Bat

ชื่อไทย ค้างคาวยอตกกล้วยปิกไส

การแพร่กระจายในประเทศไทย ทั่วประเทศ

สถานภาพ สัตว์ป่าคุ้มครอง

Least concern (IUCN)

เป็นค้างคาวขนาดค่อนข้างเล็กมาก (น้ำหนัก 3.5 - 6.0 กรัม) กินแมลงเป็นอาหาร อาศัยอยู่ตามโพรงต้นไม้ ได้หลังคาบ้าน หรือภายในถ้ำ สามารถพบได้ทั้งในพื้นที่ป่าปฐมภูมิ และป่าทุติยภูมิ รวมถึงในพื้นที่เกษตรกรรม



ค้างคาวยอตกกล้วยปิกไส



ค้างคาวหนูหูตื้นเล็กเขี้ยวยาว

วงศ์	Vespertilionidae Gray, 1821
สกุล	<i>Myotis</i> Kaup, 1829
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Myotis muricola</i> (Gray, 1846)
ชื่อสามัญ	Nepalese Whiskered Bat, Nepalese Whiskered Myotis, Whiskered Myotis
ชื่อไทย	ค้างคาวหนูหูตื้นเล็กเขี้ยวยาว
การแพร่กระจายในประเทศไทย	ทั่วประเทศ
สถานภาพ	สัตว์ป่าคุ้มครอง Least concern (IUCN)

เป็นค้างคาวขนาดเล็กค่อนข้างเล็กมาก (น้ำหนัก 3 - 7 กรัม) กินแมลงเป็นอาหาร โดยจะบินหากินในพื้นที่โล่ง รวมถึงบริเวณเหนือแม่น้ำหรือลำธาร ใกล้กับป่า ทุ่งนา และพื้นที่เกษตรกรรม อาศัยอยู่ตามโคนใบกล้วย หรือตามโพรงไม้ในป่าบริเวณหน้าปากถ้ำ



ค้างคาวหนูหูตื้นเล็กเขี้ยวยาว



ค้างคาวหนูหูตื้นเล็กเขี้ยวสั้น

วงศ์	Vespertilionidae Gray, 1821
สกุล	<i>Myotis</i> Kaup, 1829
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Myotis siligorensis</i> (Horsfield, 1855)
ชื่อสามัญ	Himalayan Whiskered Bat, Himalayan Whiskered Myotis, Siliguri Bat, Small-toothed Myotis
ชื่อไทย	ค้างคาวหนูหูตื้นเล็กเขี้ยวสั้น
การแพร่กระจายในประเทศไทย	เกือบทั่วประเทศ ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
สถานภาพ	สัตว์ป่าคุ้มครอง Least concern (IUCN)

เป็นค้างคาวขนาดเล็กมาก (น้ำหนัก 2.3 - 4.6 กรัม) กินแมลงเป็นอาหาร อาศัยอยู่ตามซอกหิน หรือภายในถ้ำ บางครั้งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ สามารถพบได้ทั้งในพื้นที่ป่าปฐมภูมิ และป่าทุติยภูมิ แต่มักจะพบในบริเวณที่ใกล้กับแหล่งน้ำ



ค้างคาวหนูหูตื้นเล็กเขี้ยวสั้น



ค้างคาวไฟหัวแบนเล็ก

วงศ์ Vespertilionidae Gray, 1821

สกุล *Tylonycteris* Peters, 1872

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Tylonycteris pachypus* (Temminck, 1840)

ชื่อสามัญ Club-footed Bat, Flat-headed Bat, Lesser Bamboo Bat, Lesser Flat-headed Bat

ชื่อไทย ค้างคาวไฟหัวแบนเล็ก

การแพร่กระจายในประเทศไทย ทั่วประเทศ

สถานภาพ สัตว์ป่าคุ้มครอง
Least concern (IUCN)

เป็นค้างคาวขนาดเล็กมาก (น้ำหนัก 3.0 - 4.8 กรัม) กินแมลงเม่า ปลวก และแมลงขนาดเล็กเป็นอาหาร อาศัยเป็นกลุ่มภายในปล้องของไม้ไผ่ที่มีรอยแยก หรือรอยแยกตามต้นไม้ เนื่องจากหัวที่ค่อนข้างแบนมาก ทำให้แทรกเข้าไปตามรอยแยกที่แคบๆ ของปล้องไม้ได้ สามารถพบได้ทั้งในพื้นที่ป่าปฐมภูมิ และป่าทุติยภูมิ รวมถึงพื้นที่เกษตรกรรม



ค้างคาวไฟหัวแบนเล็ก



ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก

วงศ์ MEGADERMATIDAE H. Allen, 1864

สกุล *Megaderma* E. Geoffroy, 1810

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Megaderma spasma* (Linnaeus, 1758)

ชื่อสามัญ Common Asian Ghost Bat, Lesser False Vampire, Lesser False Vampire Bat

ชื่อไทย ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก

การแพร่กระจายในประเทศไทย ทั่วประเทศ

สถานภาพ สัตว์ป่าคุ้มครอง
Least concern (IUCN)

เป็นค้างคาวขนาดกลาง (น้ำหนัก 18.0 - 34.0 กรัม) กินแมลงขนาดใหญ่ตามพื้น เช่น ตั๊กแตน ด้วงกลางคืน อาศัยอยู่ภายในถ้ำ ซอกหิน โพรงไม้ หรือใต้หลังคาบ้าน อาจอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ สามารถพบได้ทั้งในพื้นที่ป่าปฐมภูมิและป่าทุติยภูมิ



ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก



ค้างคาวปีกถุงเคราดำ

วงศ์ Emballonuridae Gervais, 1855

สกุล *Taphozous* E. Geoffroy, 1818

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Taphozous melanopogon* Temminck, 1841

ชื่อสามัญ Black-bearded Tomb Bat

ชื่อไทย ค้างคาวปีกถุงเคราดำ

การแพร่กระจายในประเทศไทย ทั่วประเทศ

สถานภาพ สัตว์ป่าคุ้มครอง

Least concern (IUCN)

เป็นค้างคาวขนาดกลาง (น้ำหนัก 22.0 - 35.0 กรัม) กินแมลงเป็นอาหาร อาศัยอยู่ภายในถ้ำ ซอกหิน โพรงไม้ หรือภายในวัดหรือสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ สามารถพบได้ทั้งในพื้นที่ป่าปฐมภูมิ และป่าทุติยภูมิ



ค้างคาวปีกถุงเคราดำ



ค้างคาวสามศร

วงศ์ Hipposideridae Lydekker, 1891

สกุล *Aselliscus* Tate, 1941

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Aselliscus stoliczkanus* (Dobson, 1871)


ชื่อสามัญ Stoliczka's Asian Trident Bat,
Stoliczka's Trident Bat

ชื่อไทย ค้างคาวสามศร

การแพร่กระจายในประเทศไทย ทั่วประเทศ

สถานภาพ สัตว์ป่าคุ้มครอง
Least concern (IUCN)

เป็นค้างคาวขนาดเล็ก (น้ำหนัก 4.5 - 6.9 กรัม) กินแมลงเป็นอาหาร อาศัยอยู่ภายในถ้ำหินปูน สามารถพบได้ทั้งในพื้นที่ป่าปฐมภูมิ ป่าทุติยภูมิ และพื้นที่เกษตรกรรม



ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์

วงศ์ Hipposideridae Lydekker, 1891

สกุล *Hipposideros* Gray, 1831

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Hipposideros armiger* (Hodgson, 1835)

ชื่อสามัญ Great Himalayan Leaf-nosed Bat, Great Leaf-nosed Bat, Great Roundleaf Bat

ชื่อไทย ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์

การแพร่กระจายในประเทศไทย ทั่วประเทศ

สถานภาพ สัตว์ป่าคุ้มครอง
Least concern (IUCN)



เป็นค้างคาวขนาดกลางถึงค่อนข้างใหญ่ (น้ำหนัก 45.0 - 71.2 กรัม) กินแมลงขนาดใหญ่ กบ เขียด รวมถึงค้างคาวชนิดอื่นเป็นอาหาร อาศัยอยู่ภายในถ้ำ ภายในอุโมงค์ วัด หรือสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ มักพบอาศัยอยู่กับค้างคาวชนิดอื่น สามารถพบได้ทั้งในพื้นที่ป่าปฐมภูมิ และป่าทุติยภูมิ



ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสีจาง

วงศ์ Hipposideridae Lydekker, 1891

สกุล *Hipposideros* Gray, 1831

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Hipposideros cineraceus* Blyth, 1853

ชื่อสามัญ Ashy Roundleaf Bat, Least Leaf-nosed Bat

ชื่อไทย ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสีจาง, ค้างคาวหน้ายักษ์สีจาง

การแพร่กระจายในประเทศไทย เกือบทั่วประเทศ ยกเว้นภาคตะวันออก
เจียงเหนือตอนล่าง

สถานภาพ สัตว์ป่าคุ้มครอง
Least concern (IUCN)

เป็นค้างคาวขนาดเล็กมาก (น้ำหนัก 3.1 - 5.5 กรัม) กินแมลงขนาดเล็ก
เป็นอาหาร อาศัยเป็นกลุ่มเล็กๆ ภายในถ้ำ หรือในโพรงไม้



ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสีจาง



ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กหูใหญ่

วงศ์ Hipposideridae Lydekker, 1891

สกุล *Hipposideros* Gray, 1831

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Hipposideros pomona* K. Andersen, 1918

ชื่อสามัญ Andersen's Leaf-nosed Bat, Pomona Leaf-nosed Bat, Pomona Roundleaf Bat

ชื่อไทย ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กหูใหญ่, ค้างคาวหน้ายักษ์เล็ก

การแพร่กระจายในประเทศไทย ทั่วประเทศ

สถานภาพ สัตว์ป่าคุ้มครอง
Least concern (IUCN)

เป็นค้างคาวขนาดเล็ก (น้ำหนัก 6.0 - 7.2 กรัม) กินแมลงเป็นอาหาร อาศัยอยู่ภายในถ้ำ หรือซอกหิน สามารถพบได้ทั้งในพื้นที่ป่าปฐมภูมิ ป่าทุติยภูมิ รวมทั้งในเขตชุมชน



ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กหูใหญ่



ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลีบ

วงศ์ Hipposideridae Lydekker, 1891

สกุล *Hipposideros* Gray, 1831

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Hipposideros larvatus* (Horsfield, 1823)

ชื่อสามัญ Horsfield's Leaf-nosed Bat, Intermediate Leaf-nosed Bat, Intermediate Roundleaf Bat, Intermediate Roundleaf Bat

ชื่อไทย ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลีบ

การแพร่กระจายในประเทศไทย ทั่วประเทศ

สถานภาพ สัตว์ป่าคุ้มครอง

Least concern (IUCN)

เป็นค้างคาวขนาดกลาง (น้ำหนัก 17.4 - 24.8 กรัม) กินแมลงเป็นอาหาร อาศัยอยู่ภายในถ้ำ ซอกหิน ภายในวัดหรือสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ สามารถพบได้ทั้งในพื้นที่ป่าปฐมภูมิ ป่าทุติยภูมิ รวมทั้งในเขตชุมชน



ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลีบ


- กัลยาณี บุญเกิด และไสว วังหงษา. 2547. ความหลากหลายของค้างคาวในประเทศไทย. ผลงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ประจำปี 2546: 183-195.
- พิพัฒน์ สร้อยสุข. 2554. บัญชีรายชื่อค้างคาวในประเทศไทย วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย 18 (1): 121-151.
- Bumrungsri, S., D.L. Harrison, C. Satasook, A. Prajukjitr, S. Thong-Aree and P.J.J. Bates. 2006. A review of bat research in Thailand with eight new species records for the country. Acta Chiropterologica 8: 325-360.
- CORBET, G.B. and J.E. HILL. 1992. The Mammals of the Indomalayan Region. Natural History Museum Publications, Oxford University Press, Oxford.
- Duengkae, P. 1998. Wild Mammals in Thailand. Office of Environmental Policy and Planning. Bangkok.
- Francis C.M. 2008. A Field Guide to the Mammals of Thailand and South-East Asia. Tien Wah Press, Singapore.
- IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.1. <www.iucnredlist.org>.
- Lekagul, B. and J.A. McNeely. 1977. Mammals of Thailand. Association for the Conservation of Wildlife, Bangkok.
- Simmons, N.B. 2005. Order Chiroptera. Pp. 312–529. In Mammal Species of the World: a taxonomic and geographic reference (D.E. Wilson & D.M. Reeder, eds.). The Johns Hopkins University Press, Baltimore.

ค้างคาวที่อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546

1. ค้างคาวกินแมลงหัวสั้น (*Nyctalus noctula*)
2. ค้างคาวหูช้าง (*Cheiromeles torquatus*)
3. ค้างคาวคุณกิตติ (*Craseonycteris thonglongyai*)
4. ค้างคาวจมูกหลอดทองขาว (*Murina leucogaster*)
5. ค้างคาวจมูกหลอดสีทอง (*Murina aurata*)
6. ค้างคาวจมูกหลอดสีเทา (*Murina tubinaris*)
7. ค้างคาวจมูกหลอดหุยา (*Murina huttoni*)
8. ค้างคาวจมูกหลอดหูสั้น (*Murina cyclotis*)
9. ค้างคาวดอย (*Sphaerias blanfordi*)
10. ค้างคาวดอยหลังลายขาว (*Scotomanes ornatus*)
11. ค้างคาวท้องน้ำตาลสุราษฎร์ (*Eptesicus demissus*)
12. ค้างคาวท้องน้ำตาลหูหนา (*Eptesicus pachyotis*)
13. ค้างคาวท้องน้ำตาลใหญ่ (*Eptesicus serotinus*)
14. ค้างคาวปากย่น (*Tadarida plicata*)
15. ค้างคาวปากย่นใหญ่ (*Tadarida teniotis*)
16. ค้างคาวปีกขนใต้ (*Harpiocephalus harpia*)
17. ค้างคาวปีกขนเหนือ (*Harpiocephalus mordax*)
18. ค้างคาวปีกจุด (*Balionycteris maculata*)
19. ค้างคาวปีกถุงเคราดำ (*Taphozous melanopogon*)
20. ค้างคาวปีกถุงต่อมคาง (*Taphozous longimanus*)
21. ค้างคาวปีกถุงปลอม (*Taphozous saccolaimus*)
22. ค้างคาวปีกถุงใหญ่ (*Taphozous theobaldi*)
23. ค้างคาวปีกพับกลาง (*Miniopterus medius*)
24. ค้างคาวปีกพับดำใหญ่ (*Miniopterus magnater*)

- 25 .ค้างคาวปีกพับเล็ก (*Miniopterus pusillus*)
- 26 .ค้างคาวปีกพับใหญ่ (*Miniopterus schreibersii*)
- 27 .ค้างคาวไฟหัวแบนเล็ก (*Tylonycteris pachypus*)
- 28 .ค้างคาวไฟหัวแบนใหญ่ (*Tylonycteris robustula*)
- 29 .ค้างคาวเพดานเล็ก (*Scotophilus kuhlii*)
- 30 .ค้างคาวเพดานใหญ่ (*Scotophilus heathii*)
- 31 .ค้างคาวพันธุ์ร่อน (*Phoniscus atrox*)
- 32 .ค้างคาวพันธุ์หน้าซ่อนเล็ก (*Hesperoptenus blandfordi*)
- 33 .ค้างคาวพันธุ์หน้าซ่อนใหญ่ (*Hesperoptenus tickelli*)
- 34 .ค้างคาวมงกุฎงมูกยาวเล็ก (*Rhinolophus pearsoni*)
- 35 .ค้างคาวมงกุฎงมูกยาวใหญ่ (*Rhinolophus yunnanensis*)
- 36 .ค้างคาวมงกุฎงมูกแหลมเหนือ (*Rhinolophus lepidus*)
- 37 .ค้างคาวมงกุฎเทาแดง (*Rhinolophus affinis*)
- 38 .ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก (*Rhinolophus coelophyllus*)
- 39 .ค้างคาวมงกุฎปลอมใหญ่ (*Rhinolophus shameli*)
- 40 .ค้างคาวมงกุฎมลายู (*Rhinolophus malayanus*)
- 41 .ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นเล็ก (*Rhinolophus thomasi*)
- 42 .ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นใหญ่ (*Rhinolophus acuminatus*)
- 43 .ค้างคาวมงกุฎเล็ก (*Rhinolophus pusillus*)
- 44 .ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูเล็ก (*Rhinolophus megaphyllus*)
- 45 .ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้น (*Rhinolophus stheno*)
- 46 .ค้างคาวมงกุฎสามใบพัด (*Rhinolophus trifolius*)
- 47 .ค้างคาวมงกุฎหูโตมาร์แชล (*Rhinolophus marshalli*)
- 48 .ค้างคาวมงกุฎหูโตเล็ก (*Rhinolophus macrotis*)
- 49 .ค้างคาวมงกุฎหูโตใหญ่ (*Rhinolophus paradoxolophus*)
- 50 .ค้างคาวมงกุฎใหญ่ (*Rhinolophus luctus*)
- 51 .ค้างคาวมงกุฎอินเดีย (*Rhinolophus rouxi*)

- 52 .ค้างคาวมือปุม (*Glischropus tylopus*)
- 53 .ค้างคาวแม่ไก่เกาะ (*Pteropus hypomelanus*)
- 54 .ค้างคาวแม่ไก่นครสวรรค์ (*Pteropus intermedius*)
- 55 .ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน (*Pteropus vampyrus*)
- 56 .ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง (*Pteropus lylei*)
- 57 .ค้างคาวยอดกล้วยปุม (*Kerivoula papillosa*)
- 58 .ค้างคาวยอดกล้วยป่า (*Kerivoula whiteheadi*)
- 59 .ค้างคาวยอดกล้วยปิกใส (*Kerivoula hardwickii*)
- 60 .ค้างคาวยอดกล้วยผีเสื้อ (*Kerivoula picta*)
- 61 .ค้างคาวยอดกล้วยเล็ก (*Kerivoula minuta*)
- 62 .ค้างคาวลูกหนูกรมหน้าบนเล็ก (*Pipistrellus cadornae*)
- 63 .ค้างคาวลูกหนูจิ๋ว (*Pipistrellus tenuis*)
- 64 .ค้างคาวลูกหนูถ้ำ (*Pipistrellus pulveratus*)
- 65 .ค้างคาวลูกหนูบ้าน (*Pipistrellus javanicus*)
- 66 .ค้างคาวลูกหนูสีทอง (*Pipistrellus circumdatus*)
- 67 .ค้างคาวลูกหนูอินเดีย (*Pipistrellus coromandra*)
- 68 .ค้างคาวเล็บงูด (*Eonycteris spelaea*)
- 69 .ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก (*Megaderma spasma*)
- 70 .ค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ่ (*Megaderma lyra*)
- 71 .ค้างคาวสามศร (*Aselliscus stoliczkanus*)
- 72 .ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า (*Hipposideros lylei*)
- 73 .ค้างคาวหน้ายักษ์กุ่มภกรรณ (*Hipposideros turpis*)
- 74 .ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ (*Hipposideros armiger*)
- 75 .ค้างคาวหน้ายักษ์เล็ก (*Hipposideros pomona*)
- 76 .ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กงมูกปุม (*Hipposideros halophyllus*)
- 77 .ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กดำ (*Hipposideros ater*)
- 78 .ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสองสี (*Hipposideros bicolor*)

- 
- 79 .ค้างคาวหน้ายักษ์สีจาง (*Hipposideros cineraceus*)
80 .ค้างคาวหน้ายักษ์สองหลิบ (*Hipposideros galeritus*)
81 .ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลิบ (*Hipposideros larvatus*)
82 .ค้างคาวหน้ายักษ์หมอนโค้ง (*Hipposideros diadema*)
83 .ค้างคาวหน้ายักษ์หมอบุญส่ง (*Hipposideros lekaguli*)
84 .ค้างคาวหน้ายักษ์เล็ก (*Macroglossus minimus*)
85 .ค้างคาวหน้ายาวใหญ่ (*Macroglossus sobrinus*)
86 .ค้างคาวหน้าร่อน (*Nycteris tragata*)
87 .ค้างคาวหัวดำ (*Chironax melanocephalus*)
88 .ค้างคาวหางโผล่ (*Emballonura monticola*)
89 .ค้างคาวหางหนู (*Rhinopoma microphyllum*)
90 .ค้างคาวหูหนูดอยอ่างขาง (*Myotis altarium*)
91 .ค้างคาวหูหนูตีนโตเล็ก (*Myotis horsfieldii*)
92 .ค้างคาวหูหนูตีนโตใหญ่ (*Myotis hasseltii*)
93 .ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวยาว (*Myotis muricola*)
94 .ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวสั้น (*Myotis siligorensis*)
95 .ค้างคาวหูหนูพม่า (*Myotis montivagus*)
96 .ค้างคาวหูหนูมือตีนปุม (*Myotis rosseti*)
97 .ค้างคาวหูหนูยักษ์ (*Myotis chinensis*)
98 .ค้างคาวหูหนูหน้าขน (*Myotis annectans*)
99 .ค้างคาวอีอาอีโอ (*Ia io*)
100 .ค้างคาวไ้แห้ว (*Coelops frithi*)