

สัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่เกาะทะเลไทย

(เกาะตะลุมเตา เกาะอ่างทอง เกาะสีมิลัน เกาะแสมสาร)



สัตว์

เต่าตนุ (*Chelonia mydas*)

จิ้งจกนิ้วยาวไทย (*Cnemaspis siamensis*)

ตุ๊กแกปลายจุด (*Cyrtodactylus peguensis*)

จิ้งจกหินสีจาง (*Gehyra mutilata*)

ตุ๊กแกบ้าน (*Gekko gecko*)

จิ้งจกหางหนาม (*Hemidactylus frenatus*)

ตุ๊กแกบินหางหยัก (*Ptychozoon lionotum*)

กิ้งก่าแก้ว (*Calotes emma*)

กิ้งก่าหัว (*Calotes versicolor*)

กิ้งก่าบินปีกส้ม (*Draco maculatus*)

แย้ (*Leiolepis belliana*)

จิ้งเหลนต้นไม้ (*Dasia olivacea*)

จิ้งเหลนบ้าน (*Mabuya multifasciata*)

จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง (*Riopa bowringii*)

ตะกวด (*Varanus bengalensis nebulosus*)

เหี้ย (*Varanus salvator*)

งูแสงอาทิตย์ (*Xenopeltis unicolor*)

งูเหลือม (*Python reticulatus*)

สัตว์

งูเขียวลายดอกหมาก (*Chrysopelea ornata*)

งูสร้อยเหลือง (*Lycodon capucinus*)

งูปีแก้วลายแต้มน้ำ (*Oligodon fasciolatus*)

งูสิงบ้าน (*Ptyas korros*)

งูทับสมิงคลา (*Bungarus candidus*)

งูสมิงทะเลปากเหลือง (*Laticauda colubrine*)

งูกะปะ (*Calloselasma rhodostoma*)

งูหางแฉ้นใต้ (*Trimeresurus venustus*)

งูพังกา (*Trimeresurus purpureomaculatus*)

เต่าตนุ

วงศ์	Cheloniidae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Chelonia mydas</i> (Linnaeus, 1758)
ชื่อสามัญ	GreenSea Turtle

เต่าทะเลขนาดใหญ่ กระดองมีสีน้ำตาลอ่อนและมีเส้นรัศมีสีน้ำตาลดำ กระดองท้องสีครีม หัวและขามีสีน้ำตาล เกล็ดบนส่วนหัวตอนหน้า มีจำนวน 1 คู่ เกล็ดบนกระดองแถวข้าง มีจำนวน 4 เกล็ด เกล็ดบนส่วนหัวตอนหน้า อันแรกสุดไม่ติดกับเกล็ดคอ ขอบของเกล็ดจะเชื่อมต่อกันไม่ซ้อนกัน เมื่อโตเต็มที่มีขนาดความยาวของกระดองประมาณ 100-150 เซนติเมตร กระดองหลังเรียบและแผ่นเกล็ดสันหลังขนาดเล็กกว่าแผ่นเกล็ดชายโครง แผ่นเกล็ดขอบกระดองมีขนาดเล็ก หัวมีแผ่นเกล็ดด้านหน้า 1 คู่ ปากบนไม่งุ้ม ขาที่เป็นใบพายคู่หน้ามีเล็บ 1 เล็บ และมีแผ่นเกล็ดด้านใต้รูปไข่ 1 ชิ้น

พบการกระจายในพื้นที่ หมู่เกาะตะลูลเตา หมู่เกาะสิมิลัน
เกาะอ่างทอง หมู่เกาะแสมสาร



เต่าตนุ

Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)

GreenSea Turtle

จิ้งจกนิ้วยาวไทย

วงศ์	Gekkonidae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Cnemaspis siamensis</i> (Smith, 1925)
ชื่อสามัญ	Siamese Rock Gecko

จิ้งจกขนาดเล็ก มีสีเทา หรือสีน้ำตาลเข้ม ลำตัวเรียวยาว หางยาว มักพบอาศัยอยู่ตามพื้นหรือตามก้อนหิน เกล็ดบนหลังเป็นรูปทรงกรวยขนาดใหญ่ เกล็ดท้องเป็นรูปทรงรีและเรียงตัวซ้อนกัน หัวมีความยาวประมาณ 3 เท่าของความกว้างหัว หางเรียวยาว เกล็ดหางขนาดใหญ่มีจำนวน 2-3 แถว นิ้วตีนมีรูปร่างเรียวยาว และไม่มีพังผืดยึดติด ปลายนิ้วตีนมีกรงเล็บอยู่ทุกนิ้ว

พบการกระจายในพื้นที่หมู่เกาะอ่างทอง



จิ้งจกนิ้วยาวไทย

Cnemaspis siamensis (Smith, 1925)

Siamese Rock Gecko

ตุ๊กแกป่าลายจุด

วงศ์ Gekkonidae

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cyrtodactylus peguensis* (Boulenger, 1894)

ชื่อสามัญ Spotted Gecko

ตุ๊กแกขนาดกลาง ลำตัวมีสีเหลือง-น้ำตาล บริเวณหัวมีลายร่างแหสีครีม และมีจุดระหว่างระแห 18 จุด ด้านหลังตามีแถบคาดรอบบริเวณหลังศีรษะ ด้านข้างลำตัวเป็นสีดำ บริเวณหลังมีจุดสีน้ำตาลหรือสีดำ ขาหน้าและขาหลังมีแถบสีขาวและสีเข้มคาดสลับรอบๆ หางมีแถบสีดำและสีครีมคาดรอบหางสลับกันโดยแถบสีดำกว้างกว่าแถบสีครีม เกล็ดท้องประมาณ 32 เกล็ดตามความกว้างของลำตัว

พบการกระจายในพื้นที่หมู่เกาะสิมิลัน



ตุ๊กแกป่าลายจุด

Cyrtodactylus peguensis (Boulenger, 1894)

Spotted Gecko

จิ้งจกดินลายจุด

วงศ์ Gekkonidae

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Dixoneus siamensis* (Boulenger, 1898)

ชื่อสามัญ Spotted Ground Gecko

จิ้งจกขนาดเล็ก ลำตัวยาว หัวแบน หางยาวและค่อนข้างกลม ลำตัวมีสีน้ำตาลเทา หรือสีน้ำตาลคล้ำ มีปื้นสีเข้มรูปร่างกลมกระจายอยู่บนหัว บนหลัง และขาหน้า กับขาหลังรวมทั้งนิ้วตีน และเป็นลวดลายที่ไม่มีแบบอย่างแน่นอน ขาหน้าและขาหลังค่อนข้างยาว นิ้วตีนยาว ด้านใต้ของนิ้วตีนมีแผ่นหนังแบนและบาง 1 คู่ เกล็ดบนหลัง 3-4 แถวในแนวกลางตัวมีขนาดเล็ก เกล็ดที่อยู่ถัดไปทางด้านข้างของด้านหลังมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีลักษณะเป็นหนาม เกล็ดด้านข้างลำตัวส่วนที่อยู่ทางด้านบนเป็นหนามลักษณะเดียวกับเกล็ดบนหลังที่อยู่ต่อเนื่องกัน และเปลี่ยนเป็นเกล็ดขนาดใหญ่ขึ้น หนามสั้นลง และมีรูปร่างกลมไปต่อเนื่องกับเกล็ดท้องที่มีรูปร่างกลมและแบน

พบกระจายในพื้นที่เกาะเสม็ดสาร

จิ้งจกดินลายจุด

Dixoneus siamensis (Boulenger, 1898)

Spotted Ground Gecko



จิ้งจกหินสีจาง

วงศ์	Gekkonidae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Gehyra mutilata</i> (Weigmann, 1835)
ชื่อสามัญ	Common Four-clawed Gecko

จิ้งจกขนาดเล็กลำตัวมีสีน้ำตาลเทา หรือมีการเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมที่อาศัย เกล็ดรอบลำตัวมีขนาดเล็ก หางแบนใหญ่ นิ้วตีนมีพังผืดอยู่ระหว่างนิ้วทำให้เหมาะแก่การปีนป่ายมักหลบอาศัยอยู่ตามบริเวณชายคาบ้านเรือน หรือตามเปลือกไม้

พบการกระจายในพื้นที่หมู่เกาะตะลุมเตา เกาะสิมิลัน เกาะอ่างทอง เกาะเสม็ดสาร



จิ้งจกหินสีจาง

Gehyra mutilata (Weigmann, 1835)

Common Four-clawed Gecko

ตุ๊กแกบ้าน

วงศ์	Gekkonidae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Gekko gecko</i> (Linnaeus, 1758)
ชื่อสามัญ	Tokay Gecko

ลำตัวขนาดใหญ่ มีสีเทา หรือสีเทาอมส้ม สีมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพที่อยู่อาศัย หัวมีขนาดใหญ่ หางยาว บนหัว บนหลัง บนหาง และบนขาหน้าและขาหลัง มีเกล็ดขนาดเล็กรูปหลายเหลี่ยมกระจายหนาแน่น นิ้วตีนมีเกล็ดสีส้มอมแดงกระจาย บนหลังมีจุดกลมสีฟ้าเทาเรียงตัวเป็นแถวพาดขวางลงมาถึงด้านข้างของลำตัวจำนวน 5 หรือ 6 แถว หางมีแถบสีฟ้าเทา กับสีเข้มเรียงสลับกันเป็นปล้อง ด้านท้องและคางสีขาวขุ่นและมีจุดเล็กสีส้มกระจาย แผ่นหนังใต้ผิวหนังสีดำ มักหลบบริเวณโพรงของต้นไม้ โพรงระหว่างถ้ำหรือซอกหิน

พบการกระจายในพื้นที่หมู่เกาะตะลุตเตา หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะแสมสาร



ตุ๊กแกบ้าน

Gekko gecko (Linnaeus, 1758)

Tokay Gecko

จิ้งจกหางหนาม

วงศ์	Gekkonidea
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Hemidactylus frenatus</i> Dumeril and Bibron, 1836
ชื่อสามัญ	Spiny-tailed House Gecko

มีลำตัวขนาดเล็ก สีของลำตัวมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย อาจมีสีเทา สีน้ำตาลเหลือง หรือสีน้ำตาลดำ ลำตัวยาว หัวแบน หางยาวและแบนเล็กน้อย เกล็ดบนหลังมีรูปร่างกลมและเรียบ เกล็ดด้านบนของหางเป็นตุ่มหนามและเรียงตัวต่อเนื่องกันเป็นแถวพาดขวางเป็นระยะจากโคนหางถึงปลายหาง เกล็ดใต้คางมีขนาดเล็ก เกล็ดหน้าอกและเกล็ดท้องใหญ่และมีรูปร่างกลม เกล็ดใต้หางใหญ่ บนหลังทางด้านข้างทั้งสองข้างมีทางสีเข้มพาดยาวจากด้านท้ายตาไปที่โคนหาง มักหลบซ่อนตัวตามซอกเปลือกไม้

พบการกระจายในพื้นที่หมู่เกาะตะลูเตา หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะเสม็ดสาร



จิ้งจกหางหนาม

Hemidactylus frenatus Dumeril and Bibron, 1836

Spiny-tailed House Gecko

ตุ๊กแกบินหางหยัก

วงศ์	Gekkonidae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Ptychozoon lionotum</i> Annadale, 1905
ชื่อสามัญ	Common Parachute Gecko

ลำตัวมีขนาดเล็ก มีสีเทาเข้ม หรือสีเทาน้ำตาล ลำตัวค่อนข้างแบนราบ เกล็ดบริเวณหัวใหญ่มีขนาดใหญ่กว่าเกล็ดที่ด้านท้ายทอย เกล็ดบนหลังมีเล็กและรูปร่างกลม เกล็ดท้องกลมและซ้อนเหลื่อมกัน เกล็ดใต้หางใหญ่ ด้านข้างของหัวได้ช่องเปิดหูมีแผ่นหนังแผ่ออกมา ด้านข้างลำตัวจากด้านท้ายของขาหน้าไปถึงด้านหน้าของขาหลังมีแผ่นหนังแผ่ออกมา รวมไปถึงขอบด้านข้างของหางมีแผ่นหนังแผ่ออกมา มีลักษณะเป็นรอยหยัก ส่วนปลายของรอยหยักเอนไปทางด้านท้าย ลำตัวหรือของหางเล็กน้อย

พบการกระจายในที่ หมู่เกาะสิมิลัน



ตุ๊กแกบินหางหยัก

Ptychozoon lionotum Annadale, 1905

Common Parachute Gecko

กิ้งก่าแก้ว

วงศ์	Agamidae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Calotes emma</i> Gray, 1845
ชื่อสามัญ	Forest Crested Lizard

กิ้งก่าขนาดเล็ก ลำตัวมีสีเทาอมน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมเขียว บนหัวสีคล้ำกว่าลำตัว ด้านข้างของหัวมีแถบสีดำจากส่วนปลายของปากผ่านตาไปสิ้นสุดที่แผ่นเยื่อแก้วหู ขอบปากบนและขอบปากล่างมีสีขาว บนหลังมีแถบกว้างสีดำพาดขวาง 6 แถบ และมีแถบยาวสีน้ำตาลเหลืองหรือสีน้ำตาลจางพาดจากด้านท้ายของตาไปที่โคนหาง หางมีทางสีเข้มและจางพาดขวางเป็นปล้อง ได้คางและลำคอสีดำ เกล็ดบนหัวมีขนาดไม่เท่ากัน เกล็ดบนหลังและด้านข้างลำตัวมีขนาดไม่เท่ากัน เกล็ดด้านข้างลำตัวใหญ่มีขนาดใหญ่กว่าเกล็ดบนหลัง สันของเกล็ดหลังและทางด้านบนของลำตัวมีส่วนปลายของสันชี้ไปทางด้านท้ายตัวและสันของเกล็ดเรียงเป็นแถวที่มีแนวเฉียงขึ้นไปด้านบน เกล็ดท้องมีขนาดเล็กเล็กกว่าเกล็ดหลัง เกล็ดหางเป็นสัน ท้ายของตามีหนามสั้น 1 อัน ด้านบนและค่อนมาทางด้านท้ายของแผ่นเยื่อแก้วหูมีหนามสั้น 1 อัน และที่ท้ายทอยในแนวกลางตัวมีหนามยาวหลายอันที่ล้อมรอบด้วยหนามสั้น และมีหนามต่อเนื่องไปบนหลังจนถึงโคนหางโดยหนามมีขนาดสั้นลงตามลำดับ

พบการกระจายในพื้นที่หมู่เกาะฟิลิปปินส์



กิ้งก่าแก้ว

Calotes emma Gray, 1845

Forest Crested Lizard

กิ้งก่าหัวสีแดง

วงศ์	Agamidae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Calotes versicolor</i> (Daudin, 1802)
ชื่อสามัญ	Changeable Lizard

กิ้งก่าขนาดกลาง ลำตัวมีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลเหลือง หัวและส่วนต้นของในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ลำตัวของเพศผู้จะเป็นสีน้ำตาลแดงหรือสีส้มอมแดง เกิดบนหัวเรียบและมีขนาดแตกต่างกัน เกิดที่อยู่แนวตรงกลางของหัวบริเวณท้ายทอยมีขนาดใหญ่ เกิดหลังและที่ด้านข้างลำตัวมีสัน สันของเกิดหลังและด้านข้างลำตัวมีส่วนปลายของสันชี้ไปทางด้านท้ายของตัวและสันของเกิดเรียงเป็นแถวที่มีแนวเฉียงขึ้นไปทางด้านบน เกิดบนหางใหญ่และมีสัน เกิดท้องมีสัน เกิดคอใหญ่กว่าเกิดท้อง ด้านท้ายของแผ่นเยื่อแก้วหูมีหนามสั้น 2 อัน และที่ท้ายทอยในแนวกลางตัวมีหนามสั้นหลายอันล้อมรอบด้วยหนามที่สั้นกว่า และมีต่อเนืองไปบนหลังจนถึงโคนหาง หางมีแถบสีเข้มและจางพาดขวาง ด้านข้างของหัวมีเส้นสีดำเป็นรัศมีออกไปจากตา คางและลำคอมีเส้นยาวสีเข้มหลายเส้น ด้านท้องสีน้ำตาลจางและมีเส้นสีเข้มในแนวกลางตัว กิ้งก่าวัยอ่อนมีเส้นยาวสีครีมพาดยาวอยู่ที่ด้านข้างลำตัว และพบว่าตัวเต็มวัยบางตัวก็มีเส้นนี้ด้วย ขาหน้าและขาหลังค่อนข้างยาว นิ้วตีนเรียวยาว

พบการกระจายในพื้นที่หมู่เกาะอ่างทอง

กิ้งก่าหัวแดง

Calotes versicolor (Daudin, 1802)

Changeable Lizard



กิ้งก่าบินปีกสีส้ม

วงศ์	Agamidae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Draco maculatus</i> (Gray, 1851)
ชื่อสามัญ	Orang-winged Flying Lizard

ลำตัวแบน หัวเล็ก หางยาวและโคนหางใหญ่ ด้านข้างลำตัวระหว่างด้านท้ายของขาหน้ากับด้านหน้าของขาหลังมีแผ่นหนังกว้างแผ่ออกมา แผ่นหนังนี้ได้รับการค้ำจุนด้วยกระดูกซี่โครง 5 ซี่ที่ยาวพาดด้านข้างของลำตัวออกมา เกิดหัวใหญ่ เกิดด้านข้างลำคอใหญ่และทางด้านบนของแผ่นเยื่อแก้วหูเกิดเป็นตุ่มค่อนข้างใหญ่ เกิดท้องใหญ่ เกิดหางเป็นสันใหญ่และส่วนปลายของสันชี้ไปทางด้านท้าย เกิดทางส่วนล่างของขาหน้าและขาหลังเป็นสันใหญ่ ลำตัวสีเทาและมีลายเลอะสีดำกระจาย บนหัวระหว่างตาทั้งสองข้างมีปื้นรูปสามเหลี่ยมสีดำบริเวณท้ายทอยมีแถบสีดำรูปตัววี หางมีแถบสีเข้มและจางพาดขวางเป็นปล้อง ด้านบนของแผ่นหนังข้างลำตัวมีพื้นสีส้มและมีเส้นยาวสีขาวหลายเส้นขนานกัน แผ่นหนังด้านข้างคอกมีด้านล่างเป็นสีส้ม และเหนียงใต้คอกมีโคนสีส้มแต่ส่วนปลายสีเหลืองจาง

พบการแพร่กระจายในพื้นที่หมู่เกาะฟิลิปปินส์



กิ้งก่าบินคอปีกส้ม

Draco maculatus (Gray, 1851)

Orang-winged Flying Lizard

ไ้

วงศ์	Agamidae-Subfamily
วงศ์ย่อย	Uromastycinae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Leiolepis belliana</i> (Gray, 1827)
ชื่อสามัญ	Butterfly Lizard

ลำตัวไม่มีปุ่มหนาม ลำตัวแบน หางราบ โคนหางแบนและแผ่บานออก สีข้างแผ่ขยาย ไม่มีแผงหนามที่สันหลัง ช่องหูใหญ่ เยื่อหูจมได้ผิวหนัง หนังข้างคอมีรอยพับตามขวาง หัวและหลังสีเขียวมะกอก โดยมีจุดสีเหลืองขอบดำเรียงเป็นแนวข้างตัว มีแถบดำสลับเหลืองคอมีลวดลายร่างแหดำ ประกอบสีครีม ท้องและอกสีส้มสด ตัวผู้จะมีพังพืดด้านข้าง

พบการแพร่กระจายในพื้นที่หมู่เกาะตะลุตเตา หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะเสม็ดสาร



ไ้

Leiolepis belliana (Gray, 1827)

Butterfly Lizard

จิ้งเหลนต้นไม้

วงศ์	Scincidae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Dasia olivacea</i> Gray, 1839
ชื่อสามัญ	Olivaceous Tree Skink

ลำตัวมีสีน้ำตาลอมเขียว ลำตัวป้อม หัวยาว ส่วนปลายของหัวเรียว หาวยาว หางเล็ก เกือบบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เปลือกตาล่างมีเกล็ดปกคลุมและแผ่นเกล็ดโปร่งใส เกือบบนหลังรูปร่างกลมและซ้อนเหลื่อมกัน แผ่นเกล็ดบนหลังทางส่วนต้นลำตัวมีพื้นผิวเรียบแล้วเปลี่ยนเป็นเกล็ดที่มีสันแบนทางส่วนท้ายของลำตัว เกือบบนหางมีสันแบนเฉพาะทางส่วนต้นของหาง เกือบข้างลำตัวและเกล็ดท้องเรียบ เกือบขาหน้าและขาหลังมีสัน เกือบใต้หางเรียบและแผ่นเกล็ดที่อยู่บริเวณตรงกลางขยายกว้าง เกือบรอบลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 30 เกือบ ด้านบนของหัวระหว่างตาทั้งสองข้างมีขีดตามขวางสีดำเรียงเป็นแถว 4 แถว บริเวณท้ายทอย บนหลัง ด้านข้างลำตัว และด้านบนของหางมีขีดสันสีดำจางเรียงตัวเป็นแถวพาดขวาง คางและด้านท้องสีเขียวอมฟ้าจาง ด้านหน้าของขาหน้าและขาหลังสีน้ำตาลและมีขีดยวสีดำจางตามความยาวของขาหลายเส้น ขาหน้าและขาหลังค่อนข้างสั้น

พบการแพร่กระจายในพื้นที่หมู่เกาะสิมิลัน



จิ้งเหลนต้นไม้

Dasia olivacea Gray, 1839

Olivaceous Tree Skink

จิ้งเหลนบ้าน

วงศ์	Scincidae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Mabuya multifasciata</i> (Kuhl, 1820)
ชื่อสามัญ	Common Sun Skink

ลำตัวมีสีน้ำตาล หรือสีน้ำตาลอมเขียว เกล็ดบนหลังมีขอบเป็นสีเข้ม หัวยาว ปลายของหัวเรียว ลำตัวป้อม หางยาว เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เปลือกตาล่างมีเกล็ดปกคลุมและตัวเกล็ดโปร่งแสงเล็กน้อย เกล็ดหลังรูปร่างหลายเหลี่ยมและตัวแผ่นเกล็ดมีสันแบน 3 สัน เกล็ดหางมีสันแบน 3 สัน เกล็ดข้างลำตัวมีสันแบน 3 สัน เกล็ดด้านท้องเรียบ เกล็ดรอบลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 30-34 เกล็ด ขอบด้านข้างของหัวมีแถบสีน้ำตาลจางพาดยาวจากส่วนปลายของปากผ่านไปทางด้านบนของตาและขอบด้านข้างของด้านหลัง ถึงส่วนต้นของหาง ด้านข้างลำตัวสีน้ำตาลแดงคล้ำ และมีจุดกลมสีขาวขอบด้านข้างสีดำกระจาย ขอบด้านข้างของหางสีน้ำตาลและมีจุดกลมสีขาวขอบด้านข้างสีดำกระจาย เฉพาะส่วนต้นของหาง ด้านท้องสีขาวอมเทาหรืออมเขียว ขาหน้าและขาหลังสีน้ำตาลและมีจุดกลมเล็กสีขาวกระจาย เพศผู้ในช่วงฤดูผสมพันธุ์มีคางและด้านข้างลำคอสีเหลืองอมส้ม

พบการกระจายในพื้นที่ หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะสิมิลัน



จิ้งเหลนบ้าน

Mabuya multifasciata (Kuhl, 1820)

Common Sun Skink

จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง

วงศ์	Scincidae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Riopa bowringii</i> (Gunther, 1864)
ชื่อสามัญ	Bowring's Slender Skink

จิ้งเหลนขนาดเล็ก ลำตัวมีสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลอมเขียว เรียว ยาว ห้วยาว หางยาวและใหญ่ ขาค่อนข้างเล็ก เกล็ดบนหัวเป็นแผ่น กว้าง เกล็ดหลังและเกล็ดหางใหญ่แต่เล็กกว่าเกล็ดบนหัว แผ่นเกล็ด มีสันแบนอยู่ตรงกลาง เกล็ดท้องใหญ่กว่าเกล็ดข้างลำตัว เกล็ดรอบ ลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัว จำนวน 26-30 เกล็ด ขอบด้านข้างของหัว และขอบด้านข้างของด้านหลังมีแถบสีน้ำตาลจาง ขอบล่างสีดำพาด ยาวจากส่วนปลายของปากไปที่ส่วนต้นของหาง หรืออาจถึงเกือบครึ่ง ของความยาวหาง สันแบนของแผ่นเกล็ดบนหลังและทางด้านบนของ หางสีดำทำให้มีลักษณะคล้ายเส้นสีดำพาดยาวอยู่บนหลังและบนหาง 6 เส้น ขอบปากบนสีขาว ด้านข้างของหัวและด้านข้างลำตัวสีน้ำตาล แดงและมีจุดสีดำกับจุดสีขาวเงินกระจาย แต่จุดสีดำมีมากกว่า ด้าน ข้างของหางสีน้ำตาลแดง คาง ด้านท้อง และได้หางสีเหลือง ขาหน้า และขาหลังสีน้ำตาลแดงและมีจุดเล็กสีดำกับสีขาวกระจาย

พบการกระจายในพื้นที่หมู่เกาะแสมสาร



จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง

Riopa bowringii (Gunther, 1864)

Bowring's Slender Skink

ตะกวด

วงศ์ Varanidae

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Varanus bengalensis nebulosus* (Gray, 1831)

ชื่อสามัญ Clouded Monitor

ลำตัวขนาดเล็ก มีสีเทาหรือสีน้ำตาลเทา หรือสีน้ำตาลเหลือง ความยาวลำตัวประมาณ 1 เมตร หัวสั้นและแบน หางยาว ขอบด้านบนของหางเป็นสัน เกล็ดบนหัวเล็กและแบน เกล็ดหลังและเกล็ดหางเล็ก และเรียงตัวเป็นแถวพาดขวางลำตัวและหาง เกล็ดท้องแบนและรูปร่างกลม มีปื้นสีขาวอมเหลือง (สีของตุ่มเกล็ด) กระจายบนหัว บนหลัง ด้านข้างตัว ขอบด้านข้างของหาง และขาหน้ากับขาหลังมีจุดสีขาวอมเหลืองกระจายอยู่บนพื้นสีเข้ม ขาหน้าและขาหลังสั้นแต่ใหญ่

พบการแพร่กระจายในพื้นที่หมู่เกาะตะกูลเตา

หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะสิมิลัน



ตะกวด

Varanus bengalensis nebulosus (Gray, 1831)

Clouded Monitor

เหี้ย

วงศ์	Varanidae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Varanus salvator</i> (Laurenti, 1768)
ชื่อสามัญ	Water Monitor

ลำตัวมีขนาดใหญ่ ความยาวจากปลายปากถึงรูทวารอาจมีความยาวถึง 2.5 เมตร หัวยาว หางยาวและใหญ่ ลำตัวสีดำ หรือสีน้ำตาลเทาหรือสีน้ำตาลเหลือง รูจมูกกลมอยู่ใกล้ปลายปาก เกิดบนหลังเป็นสัน เกิดต้องเป็นสันเล็กน้อย บนหลังมีจุดสีเหลืองเรียงตัวเป็นแถวพาดขวางลำตัว และส่วนหางมีแถบสีดำสลับเหลืองตลอดความยาว

พบกระจายในพื้นที่ชุ่มเกาะเสม็ดสาร



เหี้ย

Varanus salvator (Laurenti, 1768)

Water Monitor

งูแสงอาทิตย์

วงศ์	Xenopeltidae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Xenopeltis unicolor</i> Boie, 1827
ชื่อสามัญ	Sunbeam snake

งูไม่มีพิษ ลำตัวมีสีดำอมม่วงเข้ม แผ่นเกล็ดด้านบนของลำตัวมีขอบสีขาว ขอบปากสีขาว คางและด้านท้องสีขาว ใต้หางสีขาว ขุนตาเล็ก หางค่อนข้างสั้นและส่วนปลายของหางมน เกล็ดมีพื้นผิวเรียบเป็นมันและแผ่นเกล็ดซ้อนเหลื่อมกัน พื้นผิวของเกล็ดเมื่อสะท้อนแสงจะเกิดสีเหลือบของสีรุ้ง เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดบนหลังแถวด้านบนอกมีขนาดใหญ่กว่าแถวที่อยู่ในแนวกลางตัว เกล็ดท้องขยายกว้าง เกล็ดใต้หางเป็นแผ่นคู่ ยกเว้นแถวแรกกับแถวสุดท้ายที่เป็นแผ่นเดี่ยว เกล็ดรอบลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 15 เกล็ด เกล็ดท้องจำนวน 179 เกล็ด และเกล็ดใต้หางจำนวน 32 เกล็ด

พบการแพร่กระจายในพื้นที่หมู่เกาะอ่างทอง



งูแสงอาทิตย์

Xenopeltis unicolor Boie, 1827

Sunbeam snake

งูเหลือม

วงศ์	Pythonidae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Python reticulates</i> (Schneider, 1801)
ชื่อสามัญ	Reticuleted Python

งูไม่มีพิษที่มีนิสัยดุร้าย ลำตัวใหญ่ หางยาวและส่วนปลายของหางเรียว ลำตัวมีพื้นเป็นสีน้ำตาลเหลือง บนหัวและในแนวกลางมีขีดยาวสีน้ำตาลดำบนพื้นเหลืองจากส่วนต้นของหัวไปที่ท้ายทอยและมีขีดสีน้ำตาลดำจากด้านท้ายตาไปที่มุมขากรรไกร ด้านข้างของลำตัวมีแถบสีน้ำตาลเข้มเป็นรูปร่างหยักขึ้นและลงไปตลอดความยาวลำตัว เป็นงูขนาดใหญ่ หัวยาวและส่วนกว้างกว่าลำคอเล็กน้อย ส่วนปลายของหัวมน ขอบปากบนและขอบปากล่างมีแฉ่งรับรู้คลื่นความร้อนอินฟราเรด ผิวหนังลำตัวมีเกล็ดปกคลุมและพื้นผิวแผ่นเกล็ดเรียบ เกล็ดบนหัวและเกล็ดลำตัวเล็ก เกล็ดท้องขยายกว้าง เกล็ดได้หางเป็นแถวคู่ เกล็ดครอบลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 69-79 เกล็ด เกล็ดท้องจำนวน 297-332 เกล็ด และเกล็ดได้หางจำนวน 75-102 เกล็ด

พบการกระจายในพื้นที่หมู่เกาะตะลูเตา หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะสิมิลัน



งูเหลือม

Python reticulatus (Schneider, 1801)


Reticuleted Python

งูเขียวลายดอกหมาก

วงศ์	Colubridae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Chrysopelea ornata</i> (Shaw, 1892)
ชื่อสามัญ	Golden Tree Snake

งูไม่มีพิษ ลำตัวมีด้านบนของหลังเป็นพื้นสีเขียว บนหัวมีแถบสีดำและแถบสีเหลืองพาดขวาง แถบสีดำกว้างกว่าแถบสีเหลืองและมีจุดสีเหลืองกระจาย เป็นงูขนาดเล็ก หัวค่อนข้างแบนและยาว ปลายของหัวมน ส่วนของหัวกว้างกว่าลำคอ ตาใหญ่ ลำตัวยาวและแบนข้างเล็กน้อย หางยาวและส่วนปลายของหางเรียว เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดบนหลังและทางด้านบนของหางมีพื้นผิวเรียบ เกล็ดด้านท้องขยายกว้าง ขอบด้านบนของแผ่นเกล็ดมีสันและมีรอยหยัก เกล็ดใต้หางเป็นแถวคู่ แผ่นเกล็ดมีสันและมีรอยหยักลักษณะเดียวกับเกล็ดท้อง เกล็ดรอบลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 17 เกล็ด เกล็ดท้องจำนวน 222 เกล็ด และเกล็ดใต้หางจำนวน 140 เกล็ด

พบการกระจายในพื้นที่หมู่เกาะแสมสาร



งูเขียวลายดอกหมาก

Chrysopelea ornata (Shaw, 1892)

Golden Tree Snake

งูสร้อยเหลือง

วงศ์	Colubridae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Lycodon capucinus</i> Boie, 1827
ชื่อสามัญ	Common Wolf Snake

งูไม่มีพิษ ลำตัวมีสีน้ำตาลอมม่วงเข้ม มีแถบกว้างสีน้ำตาลเหลืองพาดขวางที่ท้ายทอยแผ่นเกล็ดในแถบสีเหลืองมีจุดสีน้ำตาลกระจาย ขอบปากบนสีเหลืองและมีจุดสีน้ำตาลอมม่วงเรียงตัวเป็นแถว บนหลังและทางด้านบนของหางสีน้ำตาลอมม่วง แต่มีขีดสีเหลืองเป็นโครงข่ายร่างแหที่ไม่เป็นระเบียบ (เนื่องจากแผ่นเกล็ดสีน้ำตาลอมม่วงมีขอบเป็นสีเหลืองกับสีของผิวหนังระหว่างแผ่นเกล็ด) เป็นงูที่มีขนาดเล็ก หัวแบนและส่วนของหัวกว้างกว่าลำคอ ส่วนปลายของหัวมน ตาเล็ก ลำตัวกลมและยาวหางยาวและส่วนปลายของหางเรียว ผิวหนังลำตัวมีเกล็ดปกคลุมเกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดบนหลังและทางด้านบนของหางเล็กและมีพื้นผิวเรียบและเป็นมัน เกล็ดท้องขยายกว้างและขอบด้านนอกของแผ่นเกล็ดมีสัน เกล็ดใต้หางเป็นแถวคู่ เกล็ดรอบลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 17 เกล็ด เกล็ดท้องจำนวน 188-205 เกล็ด และเกล็ดใต้หางจำนวน 61-71 เกล็ด

พบการกระจายในพื้นที่เกาะตะรุเตา เกาะอ่างทอง เกาะสิมิลัน เกาะแสมสาร



งูสร้อยเหลือง

Lycodon capucinus Boie, 1827

Common Wolf Snake

งูปีแก้วลายแต้ม

วงศ์	Colubridae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Oligodon fasciolatus</i> (Gunther, 1864)
ชื่อสามัญ	Banded Kukri Snake

งูพิษอันตราย ขนาดตัวเล็ก ลำตัวมีสีน้ำตาล หรือสีน้ำตาลเทา หัวแบน ส่วนปลายของหัวมนและมีแผ่นเกล็ดจมูก เป็นแผ่นใหญ่และหนา ตาเล็ก ลำตัวกลมและค่อนข้างสั้น หางค่อนข้างสั้น เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดบนหลังและทางด้านบนของหางเล็ก และมีพื้นผิวเรียบเกล็ดท้องขยายกว้าง เกล็ดใต้หางเป็นแถวคู่ เกล็ดรอบลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 21-22 เกล็ด เกล็ดท้องจำนวน 162 เกล็ด และเกล็ดใต้หางจำนวน 49 เกล็ด บนหลังในแนวกลางตัวไปถึงปลายหางมีปื้นใหญ่รูปร่างค่อนข้างกลมหรือรูปรีตามขวางพาดขวางเป็นระยะ (14-16 ปื้น) พื้นใต้ตรงกลางระหว่างปื้นทุกปื้นมีแถบสีเข้มแต่ไม่ชัดเจนพาดขวาง 3 แถบ

พบการกระจายในพื้นที่เกาะตะลุมเตา เกาะแสมสาร



งูปีแก้วลายแต้ม

Oligodon fasciolatus (Gunther, 1864)

Banded Kukri Snake

งูสิงบ้าน

วงศ์	Colubridae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Ptyas korros</i> (Schlegel, 1837)
ชื่อสามัญ	Indochinese Rat Snake

งูไม่มีพิษ ลำตัวมีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลดำ ขนาดใหญ่
 ตาใหญ่ ลำตัวกลมและยาว หางยาวและส่วนปลายหางเรียว ผิวหนัง
 ลำตัวมีเกล็ดปกคลุม เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้างเกล็ดบนหลังทางส่วน
 ต้นของลำตัวมีขนาดใหญ่และพื้นผิวเรียบ เกล็ดปกคลุมลำตัวและ
 หางมีขอบแผ่นเกล็ดสีจางหรือสีขาว เกล็ดใต้หางเป็นแถวคู่ เกล็ดรอบ
 ลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 15 เกล็ด เกล็ดท้องจำนวน 170
 เกล็ด และเกล็ดใต้หางจำนวน 125 เกล็ด

พบการแพร่กระจายในพื้นที่เกาะเสม็ดสาร



งูสิงบ้าน

Ptyas korros (Schlegel, 1837)

Indochinese Rat Snake

งูทับสมิงคลา

วงศ์	Elapidae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Bungarus candidus</i> (Linnaeus, 1758)
ชื่อสามัญ	Blue Krait

งูพิษอันตราย ลำตัวมีปล้องสีดำสลับขาว ขนาดตัวค่อนข้างใหญ่ ตาค่อนข้างเล็ก ลำตัวยาวและตรงกลางของหลังเป็นสันไม่สูงมาก ลำตัวไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมชัดเจน หางสั้น เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดบนหลังและด้านบนของหางมีพื้นผิวเรียบ เกล็ดใต้หางเป็นแถวเดียว เกล็ดรอบลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 15 เกล็ด เกล็ดท้องจำนวน 194-237 เกล็ด และเกล็ดใต้หางจำนวน 40-50 เกล็ด

พบการกระจายในพื้นที่เกาะตะลุดา



งูทับสมิงคลา

Bungarus candidus (Linnaeus, 1758)

Blue Krait

งูสมิงทะเลปากเหลือง

วงศ์	Hydrophiidae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Laticacauda culobrina</i> (Schneider, 1799)
ชื่อสามัญ	Yellow-lipped Sea Krait

งูทะเลพิษร้ายแรงต่อระบบกล้ามเนื้อ ลำตัวมีสีเทาดำ มีปล้องสีเทาสดับดำ 24-64 ปล้อง และหาง 3-5 ปล้อง หัวมีขนาดเล็ก บริเวณปลายปากมีลักษณะเป็นรูปเกือกม้าสีเหลืองพาดอยู่ ด้านท้องมีสีเหลือง มีรูปร่างคล้ายงูสมิงทะเลปากดำ (*L.laticaudata*) ที่เป็นงูในสกุลเดียวกัน แต่ว่างูสมิงทะเลปากเหลืองนั้นจะมีลำตัวสีที่อ่อนกว่า ส่วนหัวและหางมีขนาดเล็กและมีลายรูปเกือกม้าสีเหลือง มีการวางไข่บนบกตามบริเวณชายหาดที่มีลักษณะเป็นหาดหิน มักอาศัยอยู่ในแนวปะการังน้ำตื้นใกล้ชายฝั่ง

พบการกระจายในพื้นที่เกาะสิมิลัน



งูสมิงทะเลปากเหลือง

Laticacauda laticaudata (Linnaeus, 1758)

Yellow-lipped Sea Krait

งูกะปะ

วงศ์	Viperidae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Calloselasma rhodostoma</i> (Boiee, 1827)
ชื่อสามัญ	Malayan Pit Viper

เป็นงูพิษอันตรายในกลุ่มงูกะปะ ลำตัวมีสีน้ำตาล บนหลังสีน้ำตาลอมเทา บนหลังมีปื้นรูปสามเหลี่ยมค่อนข้างใหญ่สีดำหรือสีน้ำตาลเข้มกระจายตลอด ความยาวลำตัวยอดของปื้นรูปสามเหลี่ยมของแต่ละด้านอยู่ตรงแนวกลางตัวของด้านหลังและเป็นตำแหน่งไม่ตรงกัน บนหลังในแนวกลางตัวมีเส้นเล็กสีดำพาดยาวจนถึงโคนหางด้านท้อง และได้หางสีขาวและมีจุดสีเข้มกระจาย ลำตัวป้อมและค่อนข้างสั้น หางค่อนข้างเรียวและสั้น เกล็ดใต้หางเป็นแถวคู่ เกล็ดรอบลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 21-23 เกล็ด เกล็ดท้องจำนวน 148-166 เกล็ด และเกล็ดใต้หางจำนวน 35-52 เกล็ด พบการกระจายในพื้นที่เกาะตะลูเตา เกาะสิมิลัน



งูกะปะ

Calloselasma rhodostoma (Boiee, 1827)

Malayan Pit Viper

งูหางแหม่นไต้หวัน

วงศ์	Viperidae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Trimeresurus venustus</i> Vogel, 1991
ชื่อสามัญ	Beautiful Pit-Viper

งูพิษอันตราย ในกลุ่มงูเขียวหางไหม้ ลำตัวมีขนาดเล็ก หัวเป็นรูปสามเหลี่ยมและมีขนาดกว้างกว่าช่วงลำคอ ลำตัวเรียวยาว ปลายปากสั้นกว่างูเขียวหางไหม้ในกลุ่มเดียวกัน ด้านล่างลำตัวเป็นสีเขียว เกล็ดด้านท้องเป็นสีเขียวสลับแดง มีแถบสีขาวบริเวณเกล็ดท้องยาวตั้งแต่หัวจนถึงหาง ลักษณะภายนอกโดยทั่วไปมีความคล้ายคลึงกับงูหางแหม่นกาญจน์ งูหางแหม่นไต้หวันอาศัยอยู่บนต้นไม้ อาหารส่วนใหญ่เป็นพวกกิ้งก่า นก หนู เป็นต้น พบการกระจายในพื้นที่หมู่เกาะสิมิลัน



งูหางแหม่นไต้หวัน

Trimeresurus venustus Vogel, 1991


Beautiful pit viper

งูพังกา

วงศ์	Viperidae
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Trimeresurus purpureomaculatus</i> (Gray, 1832)
ชื่อสามัญ	Mangrove Pit Viper

งูพิษอันตราย ในกลุ่มงูเขียวหางไหม้ที่มีขนาดเล็กมักอาศัยอยู่บริเวณพุ่มไม้ป่าชายเลน โดยเฉพาะป่าโกงกาง ลำตัวมีสีเทา สีเทาดำ หรือสีน้ำตาลม่วง และมีลายขีดเขียวบนลำตัว ด้านข้างลำตัวสีเขียวขีด หรือเป็นจุดสีเขียวขีด ด้านล่างลำตัวเป็นสีเขียวมะกอก เห็นจุดดำกระจายอยู่ทั่วทั้งตัว หัวมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมเช่นเดียวกับงูในกลุ่มงูเขียวหางไหม้อื่นๆ เกล็ดบนหัวมีลักษณะเป็นตุ่มขนาดเล็ก เกล็ดรอบลำตัวมีจำนวนตั้งแต่ 25-27 ชิ้น หัวมีสีเขียวมะกอกและมีจุดสีน้ำตาล

พบการกระจายในพื้นที่หมู่เกาะตะลุมเตา



งูพังกา

Trimeresurus purpureomaculatus
(Gray, 1832)
Mangrove Pit Viper

เอกสารอ้างอิง

- Taylor, E. H. 1963. The Lizard of Thailand. Univ. Kansas. Sci. Bull. 44(14): 687-1077
- Taylor, E. H. 1965. The Serpents of Thailand and Adjacent Water. Univ. Kansas. Sci. Bull. 45(9): 609-1096
- Cox, M. J. 1991. The Snakes of Thailand and Their Husbandry. Krieger Publishing Company. Krieger drive Malabar, Florida.
- Chan-ard, T., Grossmann, W., Gumprecht, A. and Schulz, K. D. Amphibians and Reptiles of Peninsular Malaysia and Thailand An illustrated checklist. Bushmaster Publication, Wuerselen, Germany.
- Cox, M. J., Dijk, P. P. V., Nabhitabhata, J. and Thirakhupt, K. 1998. A Photographic Guide to Snakes and other reptiles of Thailand and South-East Asia. Asia Books Co., Ltd. Bangkok, Thailand.
- Nabhitabhata, J., Chan-ard, T. and Chuaynkern, Y. 2000. Checklist of Amphibians and Reptiles in Thailand. Office of Environmental Policy and Planning, Bangkok Thailand.
- Nabhitabhata, J. and Chan-ard, T. 2005. Thailand Red Data: Mammals, Reptiles and Amphibians. Office of Natural

Resources and Environmental Policy and Planning, Bangkok, Thailand.

- สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ประเทศไทย. 2548. คู่มือจำแนกสัตว์ป่า
เพื่องานป้องกัน และปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า.
สำนักพิมพ์กรีนแมคพาย กรุงเทพฯ.
- สำนักงานส่งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี. 2543. เต่าในประเทศไทย.
บริษัท เค พรินท์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพฯ.